

Βεβαιωθείτε ότι το σκεύασμα έχει διασπαρθεί και ότι δεν έχει προσκολληθεί στο εσωτερικό του δοχείου. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με το υπόλοιπο νερό με τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

#### ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΓΕΙΑΣ ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΣΤΕΙ:

Το σκέύασμα περιέχει τις δραστικές pyroxasulam και florasulam οι οποίες ανήκουν στην ομάδα B2 κατά HRAC.

#### Διαχείριση της ανθεκτικότητας:

Η επαναλαμβανόμενη χρήση δραστικών ουσιών με τον ίδιο τρόπο δράσης στο ίδιο χωράφι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης βιοτύπων ανθεκτικών σε αυτόν τον τρόπο δράσης. Προκειμένου να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος, συνιστάται να μην χρησιμοποιήσετε διαδοχικά δύο προϊόντα με τον ίδιο τρόπο δράσης στο ίδιο χωράφι. Υιοθετήστε στρατηγικές διαχείρισης ανθεκτικότητας, όπως η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης, μηχανικές μεθόδους κλπ.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, τα ανοιξιάτικα σπήρα, ο αραβόσιτος και το σόργιο μπαρούν να φυτευτούν με ασφάλεια με ελάχιστη άρση μετά από 6 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκεύασματος.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Συνιστάται να αποφεύγεται η επανείσοδος μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

#### ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Σιτάρι (σκληρό & μαλακό), Τριτικόλε, Σίκαλη: μη εφαρμόσιμο.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
Περιέχει pyroxasulam, cloquintocet-mexyl και μηλείνικο νάτριο.  
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Μην τρώετε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διαθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

#### ΠΡΩΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Μην χρηγείτε υγρά και μην προκαλέστε εμετό εάν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει στασισμούς.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέστε εμετό. Καλέστε γιατρό. Ο γιατρός θα αποφασίσει για την πρόκληση εμετού.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια πολύ καλά για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα συμβούλευσθείτε οφραχμάτρο.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με άλφιθρο νερό και σπασούνι. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την ξαναφρέστε.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν ο άνθρωπος δεν αναπνέει, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβούλη. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**  
Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): 2105714417

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκέύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφεύγετε η ύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργήσιμη γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς (50%).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

#### CORTEVA agriscience

Broadway™

85WG

ZIZANIOKTONO

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: pyroxasulam 7.1 % β/β

florasulam 1.4 % β/β

cloquintocet-mexyl 7.1 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 84.1 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο, με διασυστηματική δράση για τον έλεγχο πλατυφύλλων και αγριωτιδών ζιζανιών.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει pyroxasulam, cloquintocet-mexyl και μηλείνικο νάτριο.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280,

Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ.: 210 6889700



TM © Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 795 ΓΡ.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

1. Μετά τον ψεκασμό, αδειάστε εντελώς το δοχείο. Ξεπλύνετε τα εξωτερικά μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

2. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των ακροφυσίων χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 10% της χωρητικότητας του δοχείου. Αδειάστε το δοχείο τελιώς.

3. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ και προσθέστε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του. Αναδέστε και στη συνέχεια ξεπλύνετε τη ράβδο ψεκασμού και τις σωληνώσεις. Συμπληρώνετε με νερό, δισφαλίζοντας ότι το δοχείο είναι πλήρως γεμάτο και αναδέστε επί 15 λεπτά. Ξεπλύνετε τη ράβδο ψεκασμού και τις σωληνώσεις και αδειάστε τελιώς το ψεκαστικό.

4. Τα ακροφύστα και τα φίλτρα πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται ξεχωριστά.

5. Ξεπλύνετε το δοχείο με καθαρό νερό και ξεπλύνετε τη ράβδο ψεκασμού και τις σωληνώσεις. Αδειάστε το δοχείο τελιώς.

6. Για την απόρριψη των νερών του ξεπλύματος ακολουθήστε την κείμενη νομοθεσία. Μην τα ψεκάζετε σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε αγρούς που προορίζονται για την καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιέργειών.

**Σημείωση:** Εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης αποστράγγιση του δοχείου, το βήμα 3 πρέπει να επαναληφθεί πριν προχωρήσετε στο βήμα 4.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφόντας προηγουμένως με τρύπα, για τη διασφάλιση της μη περατέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακαύλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα του.

#### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΦΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος, με μικρότερη προτεινόμενη πίεση 2-3 atm και ψεκαστικό όγκο 10-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. Αναδέστε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευασμάτος, με σταθερή ροή μέσα στο νερό του ψεκαστικού.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Εκλεκτικό μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο, με διασυστηματική δράση για τον έλεγχο πλατύφυλλων και αγριωτιδών ζιζανιών. Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα. Αναστέλλεται τη δράση του ενύδρου οξεικογαλακτική συνθετόπιτη (acetolactate synthase – ALS). Μεταφέρεται γρήγορα διαιώνετου το θρόπο του φυτού στη μεριστωματική κύττα του φυτού. Η ανάπτυξη του φυτού μειώνεται μετά από λίγες ώρες, αν και οι τελικές επιπτώσεις χρειάζονται μερικές εβδομάδες για να φανούν.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**  
**ΣΙΤΑΡΙ (σκληρό και μαλακό), ΣΙΚΑΛΗ:** Για την καταπολέμηση αγριωτιδών και πλατυφύλλων ζιζανιών: **Δόση:** 26.5 γρ. σκ./στρ. **Όγκος υγρού:** 10 - 40 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή από την αρχή του σελέφωμάτος μέχρι και το στάδιο του 2ου γόνατου. **Μέγ. Αρ. εφαρμογών:** καλ. περίοδο: 1.

#### Παρατήρησης:

1. Η χρήση στο σπάρι περιλαμβάνει και τη καλλιέργεια του τριτικάλε.

2. Το πρώτον εφαρμόζεται με την προσθήκη ενός κατόλληρου επιπρανεόδραστικού (Codicicide, Vivotil) στη συνιστώμενη δόση.

3. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν οι καλλιέργειες είναι υπό συνθήκες στρεσ, που προκαλούνται από κρύο, έρηση, ελλείψη θρεπτικών στοιχείων κ.λπ. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, που χαρακτηρίζονται από μεγάλο θερμοκρασιακό ύψος και χαμηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές επιβραδύνσεις στην ανάπτυξη της καλλιέργειας που δεν επηρέαζουν την τελική παραγωγή.

#### Καταπολέμυμένα ζιζανία:

Ευαισθητά: Άλετονυφάρι, Καψέλλα, Κολλητοΐδα, Χαρομήλι, Ράφανος, Σινάτη, Στελλάρια, Βερόνικα, Αγριοπανσές, Αγριοβίκος.

Μετρίων ευαισθητά: Αγριοβρώμη, Βρώμας, Φάλαρη, Ήρα, Πολυκόμπι, Παπαρόνια.

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβούλευτικό εργαλείο. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.