

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Το **CABADEX Extra** δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών (χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία ή όταν φυσάει).

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το **CABADEX Extra** περιέχει 2 δραστικές ουσίες, συνεισφέρει ή πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι πολύ μικρή. Όμως είναι χρήσιμο να εφαρμόσετε τις γενικές αρχές διαχείρισης ανθεκτικότητας (μηχανικές ή καλλιεργητικές πρακτικές ελέγχου ζιζανίων και εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με σκευάσματα άλλου τρόπου δράσης).

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα του.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και**

- **σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρθεί αραβόσιτος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

- **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:**

• Σε χωράφι που εφαρμόστηκε το **CABADEX Extra**, μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, τριτσάλε, σικαλίη). Επίσης ελασκόρμηθ, αφού προηγηθεί βαθιά άρση και κατεργασία. • Σε χωράφι που εφαρμόστηκε το **CABADEX Extra**, μπορεί την επόμενη άνοιξη να σπαρθούν: κτηνοτροφικό καλαμπόκι, καλαμπόκι, ανοιξιάτικα σιτηρά (σιτάρι και κριθάρι). Επίσης ηλιανθος ή ελασκόρμηθ αφού προηγηθεί βαθιά άρση και κατεργασία του εδάφους. Καμία άλλη καλλιέργεια δεν μπορεί να σπαρθεί την επόμενη άνοιξη.

• Να μην σπέρνονται βλαβερικά και ζαχαρώδη πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και παντζύρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλια και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του **CABADEX Extra**.

- **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Για τους εργαζόμενους συνιστάται να αποφεύγεται η επαφείστος μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα. Αν εισέλθει εργαζόμενος στην ψεκασμένη περιοχή αμέσως μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά προστατευτικό ρουχισμό (μακρύ παντελόνι, μακριμάνικο πουκάμισο και κατάλληλα υποδήματα).

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Για τον αραβόσιτο μη εφαρμόσιμο. Εφαρμογή το αργότερο στα 6 φύλλα της καλλιέργειας (έως 30 Ιουνίου).

#### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καννίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • Μαζήστε τη χυμένη ποσότητα. • Διάθεση περιεχομένου/περιερίτ σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. • «Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό (μακρύ παντελόνι, μακριμάνικο πουκάμισο, κατάλληλα υποδήματα) κατά το χειρισμό του προϊόντος». • Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). • Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από ακαλιέργειες εκτάσεις με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς (75%). • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα.

#### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό και δείξτε αμέσως το δοχείο, την ετικέτα.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι για 15-20 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν ο άνθρωπος δεν αναπνέει, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

**Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρίπηγμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:** Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό και δροσερό, προστατευμένο από το ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

Ημερομηνία παρασκευής:

Βλέπε συσκευασία

Αριθμός παρτίδας:



1219

**Dow** Dow AgroSciences



Florasulam (ομάδα triazolopyrimidine)  
Mesotrione (ομάδα τρικετόνες)

**Εγγυημένη σύνθεση:**  
Florasulam 1,67% β/ο  
Mesotrione 26,7% β/ο  
Βοηθ. ουσίες 72,31% β/β

#### Πυκνό εναιώρημα (SC)

**Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον Αραβόσιτο**



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
• Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
• Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**  
**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

#### Κάτοχος της έγκρισης:

Dow AgroSciences Export SAS  
6 rue Jean-Pierre Timbaud Building Le Campus 78180 Montigny le Bretonneux, Γαλλία

Αριθμός Άδειας Διάθεσης  
στην Αγορά (ΑΑΔΑ):  
70203/24-02-2017

#### Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

**PIONEER HI-BRED HELLAS AE**  
Υΰρας 2 και Λεωφ. Κηφισίας 280  
Χαλάνδρι 15232  
Τηλ. 2108889717 FAX: 2106889799

\*\*\*Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Περιεχόμενο:  
**450 κ.εκ.**

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το Florasulam είναι αναστολέας του ενζύμου ALS (acetolactate synthase). Προκαλεί αναστολή της ανάπτυξης των ζιζανίων. Ορατά συμπτώματα εμφανίζονται μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την εφαρμογή. Καταστροφή των ευαίσθητων ειδών επέρχεται μέσα στις επόμενες 1 έως 8 εβδομάδες ανάλογα με τις καλλιεργητικές συνθήκες. Το mesotrione ανήκει στην ομάδα των τρικετόνων που παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

#### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

**ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:** Για πλατύφυλλα ζιζάνια: Λουβουδιά (Chenopodium album), Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus), Αγριοελιτζάνα (Xanthium strumarium), Αγριοσταμάδι (Solanum nigrum), Αγριοβλαβικά (Abutilon theophrasti)\*, Βλήτο πλαγιαστό (Amaranthus bioloideis)\* με **Δόση: 45 κ.εκ./στρέμμα** για **Προφυτρωτική εφαρμογή:** Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά έως και το φυτόμα του αραβόσιτου (από 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου).

• **Δόση: 30 κ.εκ./στρέμμα\*\*** για **Μεταφυτρωτική εφαρμογή:** Από το στάδιο των 2 φύλλων τα 6 φύλλα (από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου).

• **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-40 λίτρα/στρέμμα.

• **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μία (1) εφαρμογή.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

\* Τα ζιζάνια Αγριοβλαβικά (Abutilon theophrasti) και Βλήτο πλαγιαστό (Amaranthus bioloideis) καταπολεμούνται μόνο με την μεταφυτρωτική εφαρμογή.

\*\* Στην μεταφυτρωτική χρήση συστήνεται συνδυασμός στο ψεκαστικό διάλυμα με επιφανειοδραστικά σκευάσματα Polyglycol 26-2 (που περιέχουν Alkylphenol ethoxy sulfate (CAS 69029-39-6)) >99% με δόση (0,2% ο/ο ή 50 κ.εκ./στρ.), για καλύτερη αποτελεσματικότητά.

**Τρόπος εφαρμογής:** Προφυτρωτική ή νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή, με ομοιόμορφο ψεκασμό φυλλώματος, με 30-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μείση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδουση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Α) Μετά τον ψεκασμό, ξεπλένετε τα εξωτερικά μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των ακροφυσίων. Αδειάστε το δοχείο τελείως. Β) Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ και προσθέστε την συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του. Συμπληρώστε με νερό και αναδύστε. Με το ίδιο διάλυμα ξεπλένετε την ράβδο ψεκασμού, τις σωληνώσεις και τα ακροφύσια. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό. Γ) Επαναλάβετε την διαδικασία που περιγράφηκε στο σημείο Β. Δ) Τα ακροφύσια και τα φίλτρα να καθαρίζονται ξεχωριστά. Στην συνέχεια ξεπλένετε το δοχείο, τις σωληνώσεις και τα ακροφύσια με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε ίχνη του απορρυπαντικού. Αδειάστε το δοχείο τελείως. Για την απόρριψη των νερών του ξεπλύματος ακολουθήστε την κείμενη νομοθεσία. Μην τα ψεκάξετε σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε αγρούς που προορίζονται για την καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιεργειών.