

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:**

**-ΣΠΟΡΑΣΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ**

Σε περίπτωση απογειώσας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να έναντισθεί αράβοστος στην καλλιέργητη περίοδο.

**-ΣΠΟΡΑΣΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΥΝ**

- Σε χωράφι που εφαρμόστηκε το CABADEX Extra, μπορεί το φυτόντωρ να σπαρθούν χειμερινά σιτήρα (σιτάρι, κριθάρι, τριτσιά, σικάλι). Επίσης ελαιοκάρπι, αφού προηγουμένως βριάζει φραγκό και κατεργασία.
- Σε χωράφι που εφαρμόστηκε το CABADEX Extra, μπορεί την επόμενη άνοιξη να σπαρθούν: κηπυροφύκο καλαμπόκι, καλαμπόκι, ανανάκτια σιτήρα (σιτάρι και κριθάρι). Επίσης, πλάνινδες ή ελαιοκάρπι αφού προηγηθεί βαθιά άρση και κατεργασία του εδάφους. Καμία αδιλλή καλλιέργεια δεν μπορεί να σπαρθεί την επόμενη άνοιξη.
- Να μην παρέπενται βαθιάσκι και ζαχαροπέτιο που περάσουν τουλάχιστον 10 μέντρες και ποντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλια και σάγια που περάσουν τουλάχιστον 20 μέντρα από την εφαρμογή του CABADEX Extra.

**-ΤΗΣ ΠΡΩΖΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΟΠΟΥ ΤΟΝ ΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Για τους εργάζομενους συνιστάται να αποφεύγουν η πανεπισθίας μήχρις ότου στεγνώνεται το φεκατόντα διάλυμα.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΛΙΜΕΝΗ ΒΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Για τον αράβοστο μη εφαρμόσιμο. Εφαρμογή το αργότερο στα 6 φύλλα της καλλιέργειας (έως 30 λιοντίνια).

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΦΑΥΑΣΗΣ:** Μην απαντήσετε εκενέψιμα. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Η φόρατε προστατεύεται γαντιά/προστατεύτηκε ενδυμασία και μέσω αποκατήστασης για τα ματάτο πρώσων. Εδώδοστες με επιπλέον οδηγίες πριν από τη χρήση. Η φόρατε καταλήγει προστατεύτηκε ενδυμασία, γάντια και μέσω αποκατήστασης για τα ματά ταπετσάρια/φόρτωση/εφαρμογή του σκεύασμάτος.

Να φοράτε μακριμάλιο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια κατά την επανεύρεση στην καλλιέργεια. Διαθέση του περιεργεύοντος περιεχομένου με τη εθνική νομοθεσία.

**ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή μάθισης έκθεσης:** Συμβουλεύετε/ Επικεφθείτε γιατρό. Συμβουλεύετε/Επικεφθείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε οδιάθεσία.

**Σε περίπτωση κατάσπονσης:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό και δείξτε ομέως το δοχείο, την ετικέτα.

**Σε περίπτωση επίθεσης με το δέρμα:** Αφαίρεστε αμέσως τα λεπταριάμα ρούχα και πλυνθείτε αμέσως με σθόνου νερό και συποντινά για 15-20 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

**Σε περίπτωση επίθεσης με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια με σθόνου νερό για 15-20 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επιφύσης αφαιρέστε τους, φέρετε εινώνεια. Συνεχίστε να επενδέστε. Ζητήστε ιατρική συμβούλη.

**Σε περίπτωση εποντών:** Μεταφέρετε το άστομο στον καθρόπεδο αέρα. Οι ανθρώποι δεν ανανεύεται, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβούλη. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό οντότητα. Ακολουθήστε θεραπευτικά συμπτωματικά.

**ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΕΩΝ:** 210-77.93.77.77

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις διδαγμές χρήσης.

Μη ρυπαΐνετε το νερό με το προϊόν ή τη συγκεντρωτική. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιβατικά νερά.) Αποφύγετε τη μείωση πένω αποτελεύσεων από γρυποτάκτη και δρόσους).

Για να προστατεύετε τα φύτα μετάποτας να φύγετε με τη γεωργία για μια απόκρητη ζώνη ασφάλειας 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυστικών μελισσών της διατοξικής του φεκατοντά νέφους κατά 75% ή μιαν ψεκαζτή ζώνη ασφάλειας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυστικών μειώσης της διασποράς του φεκατοντά νέφους κατά 50%.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΥΠΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΗ:** Τα κενά δοχεία συσκευάσιας ζεπλενούνται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα ωρά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φεκατοντά δοχείο) και στη συνέχεια αφύπαστροφούν προηγουμένως με τριπλάσια για τη διασφάλιση της μη περιπέτερη χρήσης, εναποτέλεσμα σε σημαντικό μελλοντικό, για ανακύκλωση αναπότομη ενέργειας.

**ΣΥΝΗΧΙΣΗΣ ΑΠΟΒΗΓΕΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Στην αρχική φραγμογέννηση συσκευάσια του, σε μέρος ήρη και δροσερό, προστατευμένο από το τηλακό φάω, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια πολλάχιστα.

Ημερομηνία παρασκευής / Αριθμός παρτίδας: Βλέπε συσκευάσια

# Cabadex® EXTRA SC

## ZIZANIOKTONO

Εγγυημένη σύνθεση: Florasulam 1,67% β/β  
Mesotrione 26,7% β/β  
Bop. ουσίες 72,35% β/β

## Συμπτυκνωμένο εναιώρημα (SC)

**Προφυτωτικό και μεταφυτωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύπυλλων ζιζανίων στον Αράβοστο**



- Πολύ τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει 1,2-διεπιστολιανού-3-όν. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Ύποτη για την πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα οργάνα (οφθαλμοί) ύστερα από παρατεταμή ή επανειλιμένη έκθεση.

## ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες  
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔ): 70203/24-02-2017

## Κάτοχος της Άδειας -

**Υπέθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**  
CORTEVA AGRISCIENCE ELLA S.A.E.

Υδρα 2 και Λ. Κηφισίας 280  
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: +30 2106889700

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Προφυτωτικό και μεταφυτωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύπυλλων ζιζανίων στον αράβοστο. Το παρόντα είναι αναστόλησα τον ενιγμό ALS (acetylactate synthase). Προκειτεί αναστόλη της ανάπτυξης των ζιζανίων. Οριστικά μεταβολίσται μέσω στις επόμενες ημέρες μετά την εφαρμογή. Καταστροφή των ευαισθητών ειδών επέχεται μέσω στις επόμενες 1 έως 8 εβδομάδες ανάλογα με τις καλλιεργητικές συνθήκες. Το μεσοπότομο απόσταση στην οδού παραπομπής διαρκείει την θιασίωση των καρποτοινιδών με διάρκεια 4-HPPD.

## ΦΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΑΡΑΒΟΣΤΟΣ:** Για την αντιμετώπιση των πλατύπυλλων ζιζανίων: Λουστουδιά, Βλήτο τραχύ, Αγρυπνοτίσσα, Αγριοτομά, Αγριοβαμβακιά\*, Βλήτο πλαγιαστό\*, με Δόση: 45 κ.εκ./στρέμμα για Προφυτωτική εφαρμογή. Εφαρμογή ομέσως μετά την οπορά διάσπασης του φύτρωμα του αράβοστου (από 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου).

Η με Δόση: 30 κ.εκ./στρέμμα για Μεταφυτωτική εφαρμογή: Από το στάδιο των 2 φύλλων έως τα 6 φύλλα (από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου).

\*Όγκος φεκατοκύπα υγρού: 30-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.

**Μεγάλος ορθιμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μία (1) εφαρμογή.

## ΠΑΡΑΤΗΣΗΣ:

\* Τα ζιζανία Αγριοβαμβακιά και Βλήτο πλαγιαστό εφαρμογή ομέσως μετά την οπορά διάσπασης του φύτρωμα του αράβοστου.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Προφυτωτική ή νωρίς μεταφυτωτική εφαρμογή, με ομοιόμορφο φεκατομό φύλλωμα, σε 30-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.

## ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΚΑΤΟΚΥΠΑ ΓΥΡΟΥ:

Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση.

Γεμίστε το δοχείο των φεκατοκύπων μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαντουμένη ποσότητα συσκευάσματος μέσω στο δοχείο του φεκατοκύπου μηχανήματος. Προσθέστε το πιλοτικό νερό στην συνεχήσαντας την ανάδευση.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΕΚΑΤΟΚΥΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΝ:

Α) Μετά την φεκατομό, ξεπλύνετε τα εξοπλιτικά μετά την επιστροφή του φεκατοκύπου με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το επωτηρικό του δομένο με καθαρό νερό μετά την ανάδευση. Αδειάστε το δομένο τελείων. Β) Γεμίστε το φεκατοκύπο δομένο με καθαρό νερό κατά το μήνυμα και προσθέστε τη συνιστώντα δόση απόρρυπτανού σύμφωνα με τις οδηγίες του συμπλήρωματος με νερό και αναδέυστε. Με το διόλυντα δηλαύνεται η φάση φεκατομάς της σωλήνωσης και της ακροφύσης. Αδειάστε τελείως το φεκατοκύπο. Κάθαριστε την πλατύπασια που περιγράφεται στο σημείο Β). Δ) Τα ακροφύσα και τα φύλτρα με καθαρό νερό για φαρμάριση έχουνται. Στη συνέχεια ξεπλύνετε το δοχείο, τις σωλήνωσης και τα ακροφύσα με καθαρό νερό για φαρμάριση του απορρυπαντικού. Αδειάστε το δοχείο τελείως.

Για την απόρρυπτη των νερών του ζιζανίου παλαύστε το ακολούθως μετακεντησης νομαρχίας. Μην τα φεκατόες σε ευαισθητές καλλιεργείες ή σε αγρούς που προορίζονται για την καλλιέργεια ευαισθητών καλλιεργειών.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΧΙΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΙΣ Η ΠΡΕΒΑΛΟΜΑΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΗ:** Το CABADEX Extra δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ακροίες καρκινών συνήθεις, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των φύτων (χαμηλές ή υψηλές θερινοκρατίες, έμφραση στην άνθιση).

**ΔΙΑΣΧΙΣΜΑ ΘΕΒΑΝΕΚΤΟΠΑΤΡΑ:** Το οκεάνισμα περιέχει τη δραστική ουσία mesotione, η οποία ανήκει στην ομάδα 27 κατά ΗΡΑC και τη δραστική ουσία florasulam, η οποία ανήκει στην ομάδα 2 κατά ΗΡΑC.

Το οκεάνισμα περιέχει 2 δραστικές ουσίες, συνήθως η πιστολότητα είναι πολύ μικρή.

Να εφαρμόζεται μηχανικά ή καλλιεργητικές πρακτικές ελέγχου ζιζανίων (πάσια, εναλαγή καλλιεργείων, άρση πριν τη σπρώχη).

Να πραγματίσεται εναλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

**ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΥΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν είναι φυτοξειδώκ όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την προτεινόμενη επικέτα του.

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.