

(SIDE 1)

FACE CACHÉE RECTO

(SIDE 2)

(SIDE 3)

FACE PRINCIPALE RECTO (SIDE 4)

(SIDE 5)

VOLET PRINCIPAL RECTO

(SIDE 6)

ζιζάνια, του ζιζανιοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται, συνιστάται η εφαρμογή του CODACIDE EC σε δόση 125-250 κ.εκ./ στρέμμα, με καθολικό ψεκασμό σε ανάμειξη με εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο σκεύασμα στη συνιστώμενη δόση.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Να εφαρμόζεται πάντα σε στεγνά φυτά.
- Να μην εφαρμόζεται αντίθετα από τον άνεμο.
- Αποφύγετε τη χρήση του CODACIDE EC σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή έντονης ηλιοφάνειας.
- Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, από τροφοπενίες, προσβολές παρασίτων, ασφυξία ριζών κ.λπ.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Το σκεύασμα δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τους περιορισμούς των ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων με τα οποία συνδυάζεται.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Συνδυάζεται με εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, εφόσον στην ετικέτα τους αναγράφεται ότι συνδυάζονται με επιφανειοδραστικές ουσίες.

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα cyazifluthrin.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**  
Ισχύει η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή του ζιζανιοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



K-47312/2011 - GREECE

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:  
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

**Επιφανειοδραστικό**



**Καθαρό βάρος: 1,5 λίτρα**

**Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)**

**Εγγυημένη σύνθεση: rapeseed oil 86,4 % β/ο**  
**Βοηθητικές ουσίες: 5% β/β**

**Επιφανειοδραστικά ουσία με βάση φυτικό λάδι ελαιοκράμβης, που βελτιώνει τη δράση και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων με τα οποία συνδυάζεται.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Last updated by RESOGRAPHIC

Παρασκευαστής: Microcide Ltd,  
Shepherds Grove, Stanton, Bury St., Edmunds,  
Suffolk IP31 2 AR, Αγγλία



**Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**  
**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
Υδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280  
15232 Χαλάνδρι  
Τηλ. 210 688 9700



™ © Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

**- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**  
**- Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.**  
**- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. (Δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Συμβουλευτείτε γιατρό.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Κρατώντας τα μάτια ανοικτά, ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Το CODACIDE EC είναι επιφανειοδραστική ουσία με βάση φωτικό λάδι ελαιοκράμβης, που βελτιώνει τη δράση και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων με τα οποία συνδυάζεται. Βελτιώνει την εναπόθεση και την κατανομή του ψεκαστικού υγρού καθώς και τη διαβρεκτική ικανότητα και απορρόφηση των ζιζανιοκτόνων και μειώνει τη διασπορά των ψεκαστικών σταγονιδίων. Επίσης βελτιώνει την αντοχή στην έκπλυση από βροχή.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Καθολικός ψεκασμός σε ανάμειξη με εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο στη συνιστώμενη δόση.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ**

Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα είναι καθαρό.

Ανάμειξη με ζιζανιοκτόνο σε υγρή μορφή: Βάλτε

σε ένα δοχείο την απαιτούμενη ποσότητα του CODACIDE EC προσθέστε το ζιζανιοκτόνο και αναμειξτε μέχρι να γίνει γαλάκτωμα. Αδειάστε το γαλάκτωμα στο βυτίο ψεκασμού που περιέχει κατά το 1/3 νερό και απογεμίστε το βυτίο με νερό με συνεχή ανάδευση.

Ανάμειξη με ζιζανιοκτόνο σε μορφή βρέξιμης σκόνης ή βρέξιμων κόκκων: Βάλτε την απαιτούμενη ποσότητα ζιζανιοκτόνου σε ένα δοχείο με λίγο νερό, ώστε να σχηματιστεί πολτός (πάστα). Μετά προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα CODACIDE EC και ανακατέψτε μέχρι να γίνει γαλάκτωμα. Αδειάστε το γαλάκτωμα στο βυτίο ψεκασμού που περιέχει κατά το 1/3 νερό και απογεμίστε το βυτίο με νερό με συνεχή ανάδευση.

Ανάμειξη με ένα ή περισσότερα ζιζανιοκτόνα: Βεβαιωθείτε ότι κάθε ζιζανιοκτόνο έχει πρώτα αναμειχθεί χωριστά με το CODACIDE EC μέχρι να γίνει γαλάκτωμα.

Αδειάστε το γαλάκτωμα στο βυτίο ψεκασμού που περιέχει κατά το 1/3 νερό και απογεμίστε το βυτίο με νερό με συνεχή ανάδευση.

Τα κενά υλικά συσκευασίας να ξεπλένονται 3 φορές με νερό υπό πίεση και τα νερά να ρίχνονται στο βυτίο του ψεκαστικού. Στη συνέχεια να καταστρέφονται με τρύπημα και να απομακρύνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**Προσοχή! Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά μετά την χρήση (βλ. ειδικές προφυλάξεις του ζιζανιοκτόνου με το οποίο εφαρμόζεται).**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Για την αύξηση αποτελεσματικότητας και βελτίωση δράσης στα καταπολεμούμενα



**CORTEVA**<sup>TM</sup>  
agriscience



**CORTEVA**<sup>TM</sup>  
agriscience



**CORTEVA**<sup>TM</sup>  
agriscience