

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. "Φοράτε κατάλληλες μπότες". "Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό".

ΠΡΩΤΕΣ ΒΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυντείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλεύετε/επικεφεύτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλεύετε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάσθισης: Μην προκαλείτε εμετό. Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό αν ο παθόντας είναι αναίσθιτος ή έχει στασιμούς. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείχτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήστε μια αμέσωστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και στόρους.
- Συνιστάνται εφαρμογές χαμηλής πίεσης (χαμηλότερης από 2 ατμόσφαιρες) για την αποφυγή μεταφοράς ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές καλλιέργειες.
- Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ζεστές, εφαρμόστε το κατά τις βραδινές ώρες.
- Χρησιμοποιείτε έχωριστα ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Χρησιμοποιείτε επίπεδα ακροφύτια (flat fan) κατά την εφαρμογή.
- Μην μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό ή γενιτοκινές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Μην μολύνετε λίμνες, ρυάκια, κανάλια. ή υδατοσυλλογές με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φάλες και τα δοχεία ξέπλενται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προπογούμενς με τρύπαμα, για τη διασφάλιση της μη πρεματέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημείο συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: - Σπάρι, Κριθάρι: **60 μέρες**
- Αραβόσιτος: **Μη εφαρμόσιμο**

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και κατά αεριζόμενο ξηρό χώρο, προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες και το ήμεσο ηλιακό φως.



Dow AgroSciences

Crossbow™

600EC

ZIZANIOKTONO

2,4-D ester
(2,4-D εστέρας)

Εγγυημένη σύνθεση: 2,4 D οξύ: 60% β/ο
(υπό μορφή 2,4 D 2-αιθυλο έξυλο εστέρας (ΕΗΕ): 90,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 13,48 % β/β

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (ΕC)



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της δύσεως: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

6 rue Jean-Pierre Timbaud Building Le Campus 78180

Montigny le Bretonneux, France

Υπεύθυνος επικοινωνίας: NTY PONT ELLAS AE

Υόρας 2 και Λεωφ. Κηφισίας 280 Χαλάνδρι 15232

Τηλ. 2106889700 Fax : 2106889799

Υπεύθυνος για τη δύσεως:



PIONEER HI-BRED HELLAS AE
Υόρας 2 και Λεωφ. Κηφισίας 280
Χαλάνδρι 15232
Τηλ. 2106889717 FAX: 2106889799

® TM Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το CROSSBOW 600EC είναι εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλαταύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σταριού, κριθαριού και αραβόσιτου. Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4 D δρά οπως και οι φυσικές αυξήνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΣΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ: Για την καταπολέμηση πλαταύφυλλων ζιζανίων* με δόση 50-100 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 ανά καλλιεργητική περίοδο.

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Για την καταπολέμηση πλαταύφυλλων ζιζανίων* με δόση 50-100 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτωτική εφαρμογή στο στάδιο των 3-6 φύλλων του αραβόσιτου και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 ανά καλλιεργητική περίοδο.

*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοπιτακιά, Αναγαλιάδη, Τραχύ βλήτο, Μπιφόρα, Λουβουδιά, Κίρσιο, Περιπλοκάδα, Δωδεκάνθι, Κοινή παπαρούνα, Ραπανίδα, Άγιορο σινάπη, Αγριοπιτακιά.

Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια:

Τάτουλας, Μεγαλόκαρπτη κολλητίσια, Πολυκόμπιτη, Αγριοπιπεριά, Βερόνικα.

Παρατήρηση: Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2 atm, με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκεύασματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίνχνα του σκεύασματος. Ξέπλυντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξέπλυντε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξέπλυντε πάλι με άφθονο νερό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΟΗΚΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΓΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

- Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (υψηλαντικό μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου.
- Για την αποφυγή ζημιών σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες να αποφεύγεται η διασπορά σταγονιδίων, όταν πρέπει να εφαρμόζεται με άπνοια, χαμηλή πίεση (2 ατμόσφαιρες) και με θερμοκρασίες όχι πάνω από 30°C.

Αρ. παρτίδας / ημερ. παραγωγής: Βλέπε συσκευασία



295x130