

**Equation™**  
Core WG

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

**Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)**

Εγγυημένη σύνθεση:

famoxadone	22.5%	β/β
cymoxanil	30%	β/β
Βοηθητικές ουσίες	45.63%	β/β

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική και θεραπευτική δράση

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
Α.Α.Δ.Α.: 60936/ 03.03.2020


™ © Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

K-47281/2011 - GREECE

Last updated by RESOGRAPHIC

NOIR

## PAGE 2 (REAR COVER)



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ, ΣΤΟ  
ΘΥΜΟ ΑΔΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΨΥΤΕΡΑ ΑΠΟ  
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Ή ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ.  
ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ  
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  
ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ  
Ή ΣΤΟ ΈΜΒΡΥΟ.

P. 186 NOIR



**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αναπνέετε σταγονίδια. Πλύνετε το δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα επικίνδυνα απόβλητα.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

Πρώτες βοήθειες:

Απομακρύνετε το άτομο από τη μολυσμένη ζώνη. Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ή πιτσιλισμένα ρούχα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τους φακούς επαφής.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς τρίψιμο.

Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα.

Διατηρήστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος.

Σε περίπτωση εισπνοής: Παρακολουθείτε την αναπνοή. Αν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

Εάν το άτομο χάσει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε το στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα μισολυγισμένα. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε το άτομο που έχει υποστεί δηλητηρίαση σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία, αν είναι δυνατόν.

P. 151 NOIR

**ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ.**

**Η δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει:**

- Δερματίτιδα, επιπεφυκίτιδα, κεφαλαλγία, μυϊκή αδυναμία, αλλαγές στη συμπεριφορά, ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος, δυσκολία στην αναπνοή και καρδιακές διαταραχές.

**Συμβουλές προς τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό:**

- Σε περίπτωση κατάποσης, συνιστάται καθαρισμός του πεπτικού συστήματος, ανάλογα με το στάδιο συνείδησης.
- Ελέγξτε τους ηλεκτρολύτες και την αρτηριακή πίεση.
- Συμπτωματική θεραπεία.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. Τηλέφωνο: 210 77 93 777. Σε κάθε περίπτωση πάρτε μαζί σας τη συσκευασία ή την ετικέτα.**

#### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική και θεραπευτική δράση. Δρα δι επαφής στα βλαστάνοντα σπόρια των μυκήτων και έχει ενδοθεραπευτική δράση στο μυκήλιο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των μυκήτων. Η προληπτική δράση του σκευάσματος οφείλεται στο famoxadone, ενώ η θεραπευτική, διελασματική και τοπικά διασυστηματική δράση, στο cyproxanil.

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ**

Το Equation® Core διαλύεται εύκολα σε νερό. Γεμίστε το δοχείο

P. 151 NOIR



έως τα 2/3 της χωρητικότητάς του με νερό. Προσθέστε το Equation® Core με τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Ολοκληρώστε την πλήρωση του δοχείου με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Χρησιμοποιήστε το ψεκαστικό υγρό το συντομότερο δυνατόν.

#### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

**Αμπέλι:** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 40 γρ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20 - 150 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο μέχρι την έναρξη αλλαγής χρώματος. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

**Τομάτα (υπαίθρου):** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερνάριας. **Δόση:** 40 γρ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20 - 100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο ως τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

**Τομάτα (θερμοκηπίου):** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερνάριας. **Δόση:** 40 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Μέγιστη δόση 40 γρ./στρ. ανεξαρτήτως όγκου ψεκαστικού διαλύματος. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20 - 150 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο ως τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 4 με ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

**Πεπόνι (υπαίθρου):** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 50 γρ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30 - 100 λίτρα/στρ. **Χρόνος**

NOIR

**εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο ως τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

**Πεπόνι (θερμοκηπίου):** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 50 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30 - 100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο ως τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

**Αγγούρι, αγγουράκι, κολοκυθάκι (θερμοκηπίου):** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 50 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30 - 100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο ως τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

**Μελιτζάνα (υπαίθρου & θερμοκηπίου):** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 40 γρ./ στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20 - 100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο ως τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

**Πατάτα:** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερνάριας. **Δόση:** 40 γρ./ στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50 - 100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 1ου πλευρικού βλαστού ως το καφέτισμα του 50% των φύλλων. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 4 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Πεπόνι θερμοκηπίου και κολοκυνθοειδή θερμοκηπίου με

NOIR

βρώσιμο φλοιό (αγγούρι, αγγουράκι και κολοκυθάκι): Μη χρησιμοποιείτε δόση μικρότερη των 40 γραμμαρίων προϊόντος ανά στρέμμα.

2. Τομάτα θερμοκηπίου: Μη χρησιμοποιείτε δόση μικρότερη των 30 γραμμαρίων προϊόντος ανά στρέμμα.
3. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του κινδύνου προσβολής. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.


**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ**

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Το Equation® Core περιέχει famoxadone, δραστική ουσία που αναστέλλει την μιτοχονδριακή αναπνοή και που ανήκει στην οικογένεια των μυκητοκτόνων ασατολέων της κινολής (Qo-I). Σε αυτή την οικογένεια ανήκουν και άλλα προϊόντα για την καταπολέμηση του περονοσπόρου των εξής χημικών ομάδων: στομπλουρίνες, οξαζολιδινιδιόνες, ιμιδαζολιόνες κ.α.

Προκειμένου να αποτραπούν συμπτώματα ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται ανάλογα με την καλλιέργεια και τον εχθρό, να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

Μην πραγματοποιείτε περισσότερες από 3 εφαρμογές με Equation® Core ανά καλλιεργητική περίοδο, εναλλάσσοντας τις εφαρμογές με άλλα αποτελεσματικά μυκητοκτόνα με διαφορετικό



NOIR



τρόπο δράσης για την καταπολέμηση του περονόσπορου και της αλτερνάριας.

**Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων**

- Η εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται με νηγεμία, όταν δε φυσάει άνεμος.

- Να αποφεύγεται οποιαδήποτε διασπορά σταγονιδίων ψεκασμού προς γειτονικές καλλιέργειες.

- Αποφύγετε τη διασπορά σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε υδάτινες επιφάνειες (λίμνες, ποτάμια, αυλάκια).

**Δεν απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει 1 ώρα μετά τον ψεκασμό.**

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ**

**Αμπέλι:** 28 ημέρες

**Πατάτα:** 14 ημέρες

**Λοιπές καλλιέργειες:** 3 ημέρες

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ**

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με άφθονο νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Ξεπλύνετε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

NOIR



**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες δόσεις, καλλιέργειες και τρόπους εφαρμογής, κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Ψεκασμός καλύψεως.

**Προστασία χειριστή:**

Για κανονικό ψεκασμό με χρήση τρακτέρ σε υπαίθριες καλλιέργειες να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας και μάσκα τύπου FFP2SL ή P2 κατά την ανάμειξη / πλήρωση, ενώ κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιείτε γάντια και ενδυμασία χημικής προστασίας (που αντιστοιχεί σε εξοπλισμό τύπου 3 ή 4, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN-14605:2005 + A1:2009) και κατάλληλα υποδήματα.

Για χειροκίνητο ψεκασμό σε υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας, πατάτας και πεπονιού να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας κατά την ανάμειξη / πλήρωση, ενώ κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιείτε γάντια και ενδυμασία χημικής προστασίας (που αντιστοιχεί σε εξοπλισμό τύπου 3 ή 4, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN-14605:2005 + A1:2009) και κατάλληλα υποδήματα.

Για χειροκίνητο ψεκασμό σε καλλιέργειες θερμοκηπίου (καλλιέργειες > 1 m) να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας και μάσκα τύπου FFP3 κατά την ανάμειξη / πλήρωση, ενώ κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιείτε γάντια και ενδυμασία χημικής προστασίας (που αντιστοιχεί σε εξοπλισμό τύπου 3 ή 4, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN-14605:2005 + A1:2009) και μάσκα τύπου FFP3.

NOIR

Για χειροκίνητο ψεκασμό σε καλλιέργειες θερμοκηπίου (καλλιέργειες < 1 m) να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας, ενώ κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιείτε γάντια και ενδυμασία χημικής προστασίας (τύπου 6, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 13034:2005 + A1:2009).

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής με χρήση τρακτέρ που διαθέτει κουβούκλιο και συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα, μπορείτε να παραλείψετε τον προστατευτικό εξοπλισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα παράθυρα θα είναι κλειστά.

**Προστασία εργαζομένου:**

Να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας για εργασίες που διαρκούν πάνω από 2 ώρες σε καλλιέργειες τομάτας, πεπονίου και κολοκυνθοειδών με βρώσιμο φλοιό.

Μην ψεκάζετε το προϊόν, εάν έχετε προγραμματίσει μηχανικές εργασίες, οι οποίες μπορούν να αλλοιώσουν τα γάντια χημικής προστασίας.

Να αποφεύγετε την επαφή με υγρό φύλλωμα.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ**

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική συσκευασία σε ξηρό, όροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Να αποθηκεύεται σε χώρο που επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

Οι σακούλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό)

NOIR

και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



**CORTEVA™**  
agriscience

NOIR





**CORTEVA**<sup>TM</sup>  
agriscience

NOIR  
■

## Base

**CORTEVA™**  
agriscience

# Equation™

## Core WG

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

**Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)**

Εγγυημένη σύνθεση:

famoxadone	22.5%	β/β
cytochanil	30%	β/β
Βοηθητικές ουσίες	45,63%	β/β

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική και  
θεραπευτική δράση

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

A.A.Δ.Α.: 60936/ 03.03.2020

© Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των  
συνδεδεμένων εταιρειών της.

K-47281/2011 - GREECE

Satzspiegel

Leimzone

Lackzone

NOIR