

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/ πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναισθητός. **Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** συμβουλευτείτε έναν γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπασε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε άνετη στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευτείτε γιατρό. **Αντιδοτό:** Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών μη-στόχων, μην εφαρμόζετε αυτό το σκεύασμα ή άλλο σκεύασμα πάνω από μία φορά ανά καλλιεργητική περίοδο, για τις καλλιέργειες υπαίθρου. Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών:

- να αφήσετε μια αβέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες υπαίθρου:
 - Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, πιπεριά chili
 - Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό,
 - Φυλλώδη λαχανικά,
 - Σταυρανόη,
 - Φράουλα,
 - Καλλωπιστικά φυτά, δένδρα και θάμνοι, βολβώδη και λουλούδια και τριανταφυλλιά (< 50 cm).
- να αφήσετε για τις καλλιέργειες των καλλωπιστικών φυτών, δένδρων και θάμνων (> 50 cm).
 - Μια αβέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων (συμπεριλαμβανομένης μια φυτικής ζώνης ανάσχεσης 20 μέτρων) από τα επιφανειακά ύδατα ή
 - 50 μέτρων φυτικής ζώνης ανάσχεσης με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%.

Ημ/νία παρασκευής / Αρ. παρτίδας: βλέπε φιάλη



Spinetoram Εγγυημένη σύνθεση: spinetoram 2.5 % β/ο
Βοηθ. ουσίες: 97 % β/β

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Το EXALT® 25 SC περιέχει την δραστική εντομοκτόνο ουσία spinetoram, της χημικής ομάδας των spinosyns.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
- Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στην γονιμότητα.
- Περιέχει spinetoram και 1,2-benzisothiazolin-3-one.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση



ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

A.A.D.A.: 14742/01-04-2020

Κάτοχος της άδειας:

Dow AgroSciences Export S.A.S.
6 rue Jean-Pierre Timbaud Building Le Campus
78180, Montigny le Bretonneux, Γαλλία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Pioneer Hi-Bred Ελλάς Α.Ε.
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ. 152 32 Τηλ.: 2106889700



Περιεχόμενο:
500 Κ.ΕΚ.

***Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάστρες μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια.

Στην περίπτωση καλλιεργειών θερμοκηπίου: υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής απομακρύνοντας τις κυψέλες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και επαναφέροντας τις μόνο μετά από ένα διάστημα 24-48 ωρών. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν νερόλακκι που ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα του μείγματος της επέμβασης στον χώρο πριν επανεισάγετε τα έντομα επικονιάστρες.

Μπορεί να βλάψει τα έντομα επικονιάστρες. Αποφύγετε την περιττή έκθεση, για χρήσεις υπό κάλυψη.
Μπορεί να βλάψει τη μη στοχευόμενη πανίδα για χρήσεις υπό κάλυψη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ Ομάδα IRAC 5

Το EXALT® 25 SC περιέχει την δραστική εντομοκτόνο ουσία spinetoram, της χημικής ομάδας των spinosyns. Δρα διαφοροποιώντας την νικονινική δράση στο νευρικό σύστημα των εντόμων μέσω ενός νέου σημείου σύναψης του νικονινικού υποδοχέα. Το συγκεκριμένο σημείο σύναψης διαφέρει από εκείνο στο οποίο δρούν άλλες ομάδες εντομοκτόνων (νεονικονοειδή, άλλα νικονικά δραστικά, αβερμεκτίνες, πυρεθροειδή). Ο θάνατος του εντόμου είναι αποτέλεσμα κατάποσης ή απορρόφησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινείτε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμα της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση, αρχίστε την ανακίνηση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάστε έχοντας την ανάδευση σε λειτουργία. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό για το ψεκαστικό μίγμα και χρησιμοποιείτε το μίγμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανόμενων των ψεκαστικών πλατφόρμας) πρέπει να πλένονται σχολαστικά στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τμήμα τους. Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό, δύο με τρεις φορές, αφαιρώντας τον αφρό και τα ορατά υπολείμματα. Το νερό του ξεπλύματος να εφαρμόζεται στην καλλιέργεια αν είναι δυνατό, σύμφωνα με την ισχύουσα Ενωτική Πρακτική.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



ΠΡIN ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ/Θ) (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πιπεριά τσίλι) Για την καταπολέμηση των: Τούτα, Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτερίων. **Δόση:** 240 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα (Υ), 20-150 λίτρα/στρέμμα (Θ). **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Για τον Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για τις προνύμφες λεπιδοπτερίων εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Εφαρμογές από το στάδιο του 4^{ου} φύλλου και έως την ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1 (Υ), 3 ανά 14 ημέρες (Θ)

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ/Θ) με βρώσιμο φλοιό (Αγγούρι, Κολοκύθι) Για την καταπολέμηση των: Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτερίων. **Δόση:** 240 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα (Υ), 30-150 λίτρα/στρέμμα (Θ). **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Για τον Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για τις προνύμφες λεπιδοπτερίων εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Εφαρμογές από το στάδιο του 4^{ου} φύλλου και έως την ωρίμανση των καρπών (Υ), από το στάδιο του 1^{ου} φύλλου και έως την ωρίμανση των καρπών (Θ). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1 (Υ), 3 ανά 14 ημέρες (Θ)

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ/Θ) με μη βρώσιμο φλοιό (Κολοκύθα, Καρπούζι, Πεπόνι) Για την καταπολέμηση των: Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτερίων. **Δόση:** 240 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Για τον Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για τις προνύμφες λεπιδοπτερίων εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Εφαρμογές από το στάδιο του 4^{ου} φύλλου και έως την ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1 (Υ), 3 ανά 14 ημέρες (Θ)

ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ (Υ) (Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο Βρυξελλών) Για την καταπολέμηση των: Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτερίων. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Για τον Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για τις προνύμφες λεπιδοπτερίων εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Εφαρμογές από το στάδιο των πλήρως ανεπτυγμένων

κοτυληδόνων και έως ότου οι κεφαλές/ανθοκεφαλές αποκτήσουν το κανονικό σχήμα και μέγεθος. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ) (Μαρούλι, Λυκοτρίβολο, Ρόκα, Σινάπι, Αντιδι) (Για την καταπολέμηση των: Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτερίων. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Για τον Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για τις προνύμφες λεπιδοπτερίων εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Εφαρμογές από το στάδιο του 1^{ου} φύλλου και έως οι κεφαλές αποκτήσουν κανονικό σχήμα και μέγεθος. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1

Σπανάκι, Σέσκουλο, Αντράκλα Για την καταπολέμηση των: Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτερίων. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Για τον Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για τις προνύμφες λεπιδοπτερίων εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Εφαρμογές από το στάδιο του 1^{ου} φύλλου και έως οι κεφαλές αποκτήσουν κανονικό σχήμα και μέγεθος. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Θ) (Μαρούλι, Λυκοτρίβολο, Ρόκα, Αντιδι) Για την καταπολέμηση των: Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτερίων. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Εφαρμογές από το στάδιο του 1^{ου} φύλλου και έως οι κεφαλές αποκτήσουν κανονικό σχήμα και μέγεθος. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 3 ανά 14 ημέρες

ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ/Θ) Για την καταπολέμηση των: Δροσόφυλλα, Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτερίων. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα (Υ), 20-150 λίτρα/στρέμμα (Θ). **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Για τον Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για τις προνύμφες λεπιδοπτερίων εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Εφαρμογές από το στάδιο του 1^{ου} φύλλου έως και την ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1 (Υ), 3 ανά 28 ημέρες (Θ)

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ, ΒΟΛΒΩΔΗ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Υ/Θ) Για την καταπολέμηση των: Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτερίων. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα (Υ), 30-150 λίτρα/στρέμμα (Θ). **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Για τον Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για τις προνύμφες λεπιδοπτερίων εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο /μεσοδιάστημα: 1 (Υ), 2 ανά 14 ημέρες (Θ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΥΣΤΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα ή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Ανάπτυξη ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, μην εφαρμόζετε το συγκεκριμένο σκεύασμα ή οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που περιέχει spinosyns (spinetoram ή spinosad), για την αντιμετώπιση της *Tuta absoluta* και του *Frankliniella occidentalis*, πάνω από 3 φορές ανά κύκλο καλλιέργειας υπό κάλυψη. Χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε πρόγραμμα εναλλαγής με άλλα εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Χρησιμοποιείτε το σκεύασμα έως 2 εφαρμογές ανά χρήση (συνδυασμός καλλιέργειας εχθρού). **ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (BBCH 61 – 69)**

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Μη φυτεύετε μια φυλλώδη καλλιέργεια μικρού κύκλου (περίπου 30 ημέρες μεταξύ σποράς / φύτευσης και συγκομιδής) στον αγρό όπου έχει γίνει εφαρμογή με EXALT 25 SC, τουλάχιστον για 120 ημέρες μετά την εφαρμογή. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ:** 48 ώρες μετά την εφαρμογή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το EXALT® 25 SC δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή του σκευάσματος σε μικρό αριθμό καλλωπιστικών φυτών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πιπεριά Chili, Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό, Φυλλώδη λαχανικά, Φράουλα: 3 ημέρες. Σταυρανόη: 7 ημέρες.

232x120