



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.09.2022  
Αριθ. πρωτ: 8617/252000

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Λ. Απόχα / Γ. Τσολομύτη  
Τηλέφωνο: 210 9287165/210 9287247  
e-mail: [lapocha@minagric.gr](mailto:lapocha@minagric.gr)  
[gtsolomiti@minagric.gr](mailto:gtsolomiti@minagric.gr)

Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280  
15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
email: [fotini.tsali@corteva.com](mailto:fotini.tsali@corteva.com)  
[evangelos.diamantis@corteva.com](mailto:evangelos.diamantis@corteva.com)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 60510 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FONTELIS 20 SC (penhthiopyrad 20% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητα και προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Την αριθμ. 1182/13612/24.02.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60510 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FONTELIS 20 SC (penhthiopyrad 20% β/ο) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την αριθμ. 8617/252000/01.09.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τη συμπληρωματική αίτηση αυτής με αριθμ. 8910/260209/08.09.2022.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 60510 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FONTELIS 20 SC (penthiopyrad 20% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 1182/13612/24.02.2016 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **5, 10, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUCO)	<u>Φουζικλάδιο</u> <i>Venturia inaequalis</i> (VENTIN), <i>Venturia pyrina</i> (VENTPI) <u>Ωίδιο</u> <i>Podosphaera leucotricha</i> (PODOLE) <u>Αλτερνάρια</u> <i>Alternaria sp.</i> (ALTESP) <u>Στεμφύλιο</u> <i>Stemphylium vesicarium</i> (PLEOAL)	112,5*	75	100-150*	Όταν αναμένεται εμφάνιση της ασθένειας (BBCH 10 έως το PHI) * Σε περίπτωση εφαρμογών έως το τέλος της ανθοφορίας, χρησιμοποιήστε όγκο νερού 100-120 λίτρα/στρ. (75-90 ml προϊόν / στρ.)	2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες
Τομάτα Βιομηχανική, Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME), Αγγούρι (CUMSA) (Υπαίθρου)	<u>Βοτρύτης</u> <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	240	200	50-120	Από την έναρξη της ανθοφορίας όταν ο πρώτος ανθοφόρος οφθαλμός είναι ορατός μέχρι την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 51-89) Ελάχιστη δόση 200 κ.εκ. ανεξαρτήτως	1

					όγκου ψεκαστικού διαλύματος	
Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME), Αγγούρι (CUMSA) (Θερμοκηπίου/ προστατευόμενα)	<u>Βοτρύτης</u> <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	240 max (για μία εφαρμογή) 400 max (για 2 εφαρμογές)	200	50-120	Από την έναρξη της ανθοφορίας όταν ο πρώτος ανθοφόρος οφθαλμός είναι ορατός μέχρι την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 51-89)	2 εφαρμογές με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες. Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 400 ml/στρ. Για παράδειγμα αν στη 2 <sup>η</sup> εφαρμογή γίνει επέμβαση με 120 λίτρα/στρ., στην 1 <sup>η</sup> θα πρέπει να έχει γίνει επέμβαση με 80 λτ./στρ. Η δόση 200 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού παραμένει σταθερή.
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (με βρώσιμο φλοιό): Αγγούρι (CUMSA) (Υπαίθρου)	<u>Ωίδιο</u> <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU)	240		50-120	Από την εμφάνιση των ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89)	1
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (με βρώσιμο φλοιό): Αγγούρι (CUMSA) (Θερμοκηπίου)	<u>Ωίδιο</u> <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU)	100 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 300 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)		20-150	Από την εμφάνιση των ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89) Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 400 κ.εκ.σκευ./ στρ.	2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες
ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μαρούλι (LACSA), Σπανάκι (SPQOL),	<u>Βοτρύτης</u> <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	150		20-100	Από το στάδιο της έκπτυξης του 10% των φύλλων έως την	1

Λικοτρίβολο (VLLLO), Ρόκα (ERUVE), Κάρδαμο (BARVE), Σέσκουλο (BEAVV) (Υπαίθρου)	<u>Σκληρωτινίαση</u> <i>Sclerotinia sp</i> (SCLESP)				συγκομιδή. (BBCH 40-49)	
Πιπεριά (CPSAN) (Θερμοκηπίου)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	100 - 200 (1 <sup>η</sup> εφαρμογή) + 200 -300 (2 <sup>η</sup> εφαρμογή)		50-150	Από την εμφάνιση των ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89) Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 400 κ.εκ.σκευ./στρ.	2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: <b>Ροδακινιά</b> (PRNPS), <b>Βερυκοκκιά</b> (PRNAR)	<u>Μονίλια</u> <i>Monilinia fructigena</i> (MONIFG), <i>Monilinia laxa</i> (MONILA), <i>Monilinia fructicola</i> (MONIFC), <i>Monilinia sp</i> (MONISP).	120		50-100	Για την καταπολέμηση της Μονίλιας συνίσταται 1 εφαρμογή κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. (BBCH 60-69)	2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.
	<u>Ωίδιο</u> <i>Podosphaera tridactyla</i> (PODOTR), <i>Sphaerotheca pannosa</i> (SPHRPA)	150			Για την καταπολέμηση του Ωιδίου, συνίσταται 1 εφαρμογή από την καρπόδεση έως το 90% της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 71-89)	
Φράουλα (FRAAN) (Υπαίθρου/Θερμοκηπίου)	<u>Βοτρύτης</u> <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	90		20-100	Με την εμφάνιση των πρώτων ανθικών καταβολών στη βάση της ροζέτας μέχρι την συγκομιδή.	2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες

					(BBCH 55-89) Η συνιστώμενη δόση είναι 90 κ.εκ.σκευ./στρ. ανά εφαρμογή. Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 180 κ.εκ.σκευ./στρ.
<p><b>Παρατηρήσεις:</b></p> <p>1. Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού και τους εξοπλισμούς διανομής που χρησιμοποιούνται, συνιστάται να τηρείτε τις ελάχιστες και μέγιστες δόσεις προϊόντος / στρέμμα που αναφέρονται.</p> <p>2. Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Αγγούρι (Θ), Πιπεριά (Θ): Η συνολική δόση ανά καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 400 κ.εκ/στρ.</p> <p>3. Μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες.</p>					

**10.** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P264: Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**«Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή»**  
**«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας»**

SP1: ΜΗ ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe2: Για την προστασία των υπόγειων υδάτων μην εφαρμόζετε σε εδάφη με περιεκτικότητα άμμου μεγαλύτερη του 80%.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης:

- 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% για τις καλλιέργειες των μηλοειδών και των πυρηνοκάρπων.
- 18 μέτρων για τις καλλιέργειες της τομάτας, της πιπεριάς, της μελιτζάνας, του αγγουριού (υπαίθρου και θερμοκηπίου).
- 10 μέτρων για τις καλλιέργειες της φράουλας και των φυλλωδών λαχανικών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
<b>ΜΗΛΙΑ (0130010), ΑΧΛΑΔΙΑ (0130020)</b>	21 ημέρες
<b>ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (Υ) (0231010), ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ) (0231010), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ) (0231030), ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ) (0232010), ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ) (0231020), ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ+Θ) (0152000)</b>	1 ημέρα
<b>ΜΑΡΟΥΛΙ (0251020), ΣΠΑΝΑΚΙ (0252010), ΛΙΚΟΤΡΙΒΟΛΟ (0251010), ΡΟΚΑ (0251060), ΚΑΡΔΑΜΟ (0251040), ΣΕΣΚΟΥΛΟ (0252030)</b>	14 ημέρες
<b>ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ (0140030), ΒΕΡΥΚΚΟΚΙΑ (0140010)</b>	3 ημέρες

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1182/13612/24.02.2016 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**