

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΓΕΙΑΣ ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΝΠΟΛΕΙΣΤΕΙ:**

• Αρκεί μια ώρα (1 ώρα) μεταξύ φεκσούμου και βροχόπτωσης, για να ευχρηστεί το προϊόν μέσα στη φυτά.

• Εφόμπρωτες σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση ευρωτικής.

• Απόφευγετε τη διαρροή φεκσούμου νέφους σε γειτονικές ευαλιθείς καλλιέργειες, ελαιοκαρπή, τεύλια, μιτσέλια, λινάρι, καλλιέργειες ψυχνήμον και καλλιωπιτικά, φυτώρια καθώς και σε πολυετείς καλλιέργειες (αμπέλια και σπωρόφρα).

• Εφόμπρωτες απουσία ανέμου και με θερμοκρασίες που δεν ξεπερνούν τους 25°C.

• Μην χρησιμοποιείτε το κομπότη ή την κοπριά που έχει παραχθεί από υπολείμματα φεκσούμων καλλιέργειών (ανά/άνηρ) για τη λιπαντή ηπειρωτικήν ή καλλιωπιτικήν.

#### ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες:

- florasulam που ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC και
- clopyralid που ανήκει στην ομάδα 4 κατά HRAC.

Να εφορμούνται εναλογικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργειακά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοτονίων με διαφορετικό τρόπο δράσης στην αποφύγη ανάτιξη ανεκτικότητάς των ζιζανίων.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΗΤΑΣ, ΕΥΑΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΑΗΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΒΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό σταν χρησιμοποιείται συμφωνά με την προτεινόμενη επέντετα του.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ -ΣΠΟΡΑ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:**

• Να πρέπει μια βλάστηση περιόδου 125 ημέρων μετά την εφαρμογή του σκεύασματος και πριν την φύτευση μια νέας καλλιέργειας στην ίδια περιοχή.

• Καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε λιγύτερο από 125 ημέρες μετά την εφαρμογή δεν πρέπει να φεκάνονται ξανά με ζιζανιοτονία που περιέχουν clopyralid.

• Σε περιπτώση αποτυχίας της καλλιέργειας μετά την εφαρμογή του σκεύασματος που περιέχουν clopyralid.

• Σε περιπτώση αποτυχίας της καλλιέργειας μετά την εφαρμογή του προϊόντος, μπορεί χωρίς να προηγηθεί άρων να γίνει σπορά σπιτρών, αγριωτών για ωρατοφή ή μετά την πέραση ενός μήνα αρθρώσουται.

**-ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΟΝ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Οποτεστεγνώστε την περιοχή υγρό πάνω στα φυτά.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Σπερτοπτικές-Σπελτά, Κρήβαρη, Σικάλη, Βρώμη: Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής.

#### ΑΝΔΙΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Απόφευγετε να αναπτύξετε σκόνη/ αναθυμάσιες/ αέρια/ σταγνωμάδια/ απομειωτικά. • Μην τρέπετε πάνετε ή καπνίζετε όπαντα χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια προστατευτικά ενδύματα μέσα από μικρές προστασίες για τη μάτια / πρόσωπο. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν ουδεμίας επιθυμείτε. • «Φοράτε ολόψην φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ονομά, φρτώστε και εφερμούτε το σκεύασμά σας». • «Φοράτε ολόψην φόρμα εργασίας και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου μετά το φεκσόμη». • Διάθεση του περιεχομένου περιέχει άνημα με την εθνική νομοθεσία.

#### ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ:

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθάνθετε αδιαθεσία.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** μεταφέρετε το πονόντα στον καθρό αέρα και συμβουλεύετε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

**Σε περίπτωση εποφής με το δέρμα:** αφοράτε τα ρούχα που μολύνθηκαν. Πλυνθείτε αμέσως με αθόνο νερό για 10-15 λεπτά.

Συμβουλεύετε γιατρό.

**Σε περίπτωση εποφής με το μάτι:** Επιλύνετε προσεκτικά για 15-20 λεπτά κρατώντας τα μάτια ανοιχτά. Αφοράτε τα τους φακούς εποφής, αν υπάρχουν, μετά τα 5 πρώτα λεπτά, υπέρταση στο έπιπλο.

Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό για συμβουλές αντιμετώπισης.

**Σε περίπτωση κατόπιν:** Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Να έχετε διαβάσει το πρόιόν την επέλετα του.

**ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

**Τηλ. Γραμμή Επικοινωνίας SGS (24/7): 2105714417**

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οικολογίσθετε τις διάδικτες χρήσης.»

Μην πατήσετε το νερό με το σκεύασμα ή τη σκευασμάτικη. Μην πλένετε τον εξοπλισμό σαρωτήρας κατά την επιφάνεια της ουσίας. Μη αποφεύγετε τη μόντανη μέθοδο των ανθυμάσιων οργανισμών για την εφαρμογή στα χειρεργικά σπίτια να αφήσετε μια συντήρηση ανάσχεσης 10 μέτρων από την επιφανειακή ύδατα και μην εφαρμόσετε το σκεύασμα σε τεχνητά αποτραγγίζουμενα εδάφη.

Για να προστατεύετε τα φύτα μητ-στάχους, να χρησιμοποιήσετε ακροφύτων μετωπός του φεκσούμου νέφους κατά 90% ή - να αφήσετε μια αύξηση 30% μέτρων από τη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύτων μετωπός του φεκσούμου νέφους κατά 50% ή - να αφήσετε μια αύξηση 30% προς την προστασία των γεωργικών γηών.

• Μπορεί να προκαλεστεί ερεθισμός της αντισυντοκής οδού.

• Περιέχει 1,2-benzisotiazolin-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλεστεί αλλεργική αντίδραση.

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**UFI: CGT6-V095-900A-200Y**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

A.A.D.A.: 70150/30.03.2016 / 1η ανανέωση: 24.03.2022  
**Κάτοχος της διέσιας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:** CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Υδρα 2 και Λ. Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 6889700  
**Περιεχόμενο: 450 Κ.ΕΚ.**  
\* Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατιύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες οινοπνεύματος.

Το **florasulam** ανήκει στην ομάδα των florasulonylindane sulfonanilides που είναι αναπαναστατικά στο ALS (acetolactate synthase) το οποίο είναι απαραίτητο για τη δημιουργία όμων εων των ζιζανίων. Προκαλεί αναπαναστατικής της εφαρμογής πλέον. Καταστροφή των ειδικοτήτων ειδών επέρχεται μέσα στις επόμενες 1 έως 8 εβδομάδες απόδοσης.

Το **clopyralid** ανήκει στην ομάδα των pyridine-carboxylic acids. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες ενώ μεταφέρεται τόσο μέσω μεταβολισμού όσο και μεταβολισμού συνδεσμών. Το κύτταρο περιέχει την πυριδίνη-carboxylic acids. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες ενώ μεταφέρεται τόσο μέσω μεταβολισμού όσο και μεταβολισμού συνδεσμών (πυριδομονίν). Το κύτταρο επικρατεί κατά την αισθητή ημέρα της ημέρας οργισμού του ζιζανίου.

**ΦΟΡΔΑ ΔΡΑΣΗΣ**

**ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ:** Στάρι (οικλόρ και μαλάκο), Κριθόρι, Σικάλη, για Πλατιφύλλα ζιζανία\* Δόση: 15 κ. εκ. σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-40 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτωτική εθολόκη εφαρμογή φυλλώματος από τα μέσα του οδελφώματος (5 άδελφα) έως το σημαντικό του δεύτερο κούμπο.

**Μεγάτος οριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητη περιόδο:** 1.

**ΑΝΟΙΞΤΑΚΙΑ ΣΙΤΗΡΑ:** Στάρι (οικλόρ και μαλάκο), Κριθόρι, Σικάλη, για Πλατιφύλλα ζιζανία\* Δόση: 15 κ. εκ. σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-40 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτωτική εθολόκη εφαρμογή φυλλώματος από τα μέσα του οδελφώματος (5 άδελφα) έως το σημαντικό του δεύτερο κούμπο.

**Μεγάτος οριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητη περιόδο:** 1.

**ΠΑΡΑΠΡΗΤΙΚΑ:**

1. Η χρήση στα χειμερινά στηρίγμα περιλαμβάνει και τη τριτοκάλι και τη Σπέλτα.
2. Καταπολεμούμενα ζιζανία:
- \* Πολύ ευαίσθητη ζιζανία: Στελλάρια, Καψέλλα, Χαμομήλι, Μεγαλόκαρπη κολλητοΐδια.
- Ευαίσθητη ζιζανία: Παπανίδα, Ραπανίδα, Ραπανίδα, Αγριοπιτεριά.
- \*\* Πολύ ευαίσθητη ζιζανία: Καφέλια, Μεγαλόκαρπη κολλητοΐδια, Πολικόμη, Αγριοπιτεριά.
- Ευαίσθητη ζιζανία: Καφέλια, Στελλάρια, Καψέλλα, Χαμομήλι, Μεγαλόκαρπη κολλητοΐδια.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΔΡΟΓΗΣ:** Μεταφυτωτική εφαρμογή, με καθολικό φεκσόμι φυλλώματος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του φεκσούμου κατά το ίματο με καθρό νερό. Αναδεύετε καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας την επιφάνεια της ουσίας. Γεμίστε το δοχείο του φεκσούμου με το υπόλοιπο νερό με τον αναδέστηρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του φεκσούμου.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:** 1. Αμέσως μετά την φεκσούμη. Επιλύνετε το εσωτερικό του δοχείου με καθρό νερό. Συμπεριλαμβανόμενων των συλήνων χρησιμοποιώντας το 1/10 της χωρητικότητας του δοχείου. Αδειάστε το δοχείο των εγκεκριμένων δοσών. 2. Επιλύνετε τους βραχίονες και τους ευκάρπους σαλήνες, και φεύγατε (κατά πρώτη φορά σε υψηλή ταχύτητα και χαμηλή πίεση) στο χωρό χωρίς να υπερβείτε την εγκεκριμένη δοσή εφαρμογής μεχρι να στεγνώσετε ινάλια. 3. Γεμίστε το φεκσόμι δοχείο με καθρό νερό κατά την προστίμηση και προθέστε κατάλληλο απορρυπαντικό στην ουσία. Γεμίστε το δοχείο του φεκσούμου με την προτίμηση σε υψηλή ταχύτητα και χαμηλή πίεση. 4. Τα ακροφύτα και τα φύλλα πρέπει να καθαριστούν έχουμεντα με απορρυπαντικό και καθρό νερό. 5. Επιλύνετε το δοχείο του φεκσούμου με καθρό νερό και περάστε το νερό με πίεση από σαλήνες και ακροφύτα. Αδειάστε τελείως το δοχείο του φεκσούμου. 6. Για την απορρύπανση των γεράνων του εξιστόματος ακολουθήστε την κείμενη νομοθεσίας. 7. Οποιοδήποτε υπόλειμμα στο εξιστόματος που εξιστά με την κείμενη νομοθεσία πρέπει να αφαιρούνται με πλύσιμο με καθρό νερό κατά πρώτη φορά σε αρκούδη περιοχή.

Hμίνια παρασκευής - Αρ. παρτίδας: Βλέπε συσκευασία

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

