

VydateTM

MAX 10 G

ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ

Κοκκώδες (GR)

Εγγυημένη σύνθεση:

Oxamyl 10 % β/β

Βοηθητικές ουσίες 89,9 % β/β

Διασυστηματικό καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο με διπλή δράση (επαφής και στομάχου)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΘΑΝΑΤΟΦΟΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ.
ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

A.A.Δ.A.: 3070/ 06.02.2020

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280,15232, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ.: 210 688 9700

K-47238/2010 (FRONT) - GREECE

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό. Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε πρώτες βοήθειες στην ετικέτα). Ξεπλύνετε το στόμα. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Πλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση και τα μολυσμένα αντικείμενα

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά νερά.


Για να προστατέψετε τα πουλιά και τα άγρια θηλαστικά, το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών

Για να προστατέψετε τα πουλιά και τα άγρια ζώα, μαζέψτε όσο προϊόν έχει διασκορπιστεί κατά λάθος.

TM ® Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.



ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 10 KG



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα).

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εάν είναι αναγκαίο, χορηγήστε οξυγόνο ή εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Χορηγήστε 2 ποτήρια νερό. Προκαλέστε εμετό μόνον εάν το άτομο έχει τις αισθήσεις του. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τη δερματική περιοχή στην οποία έπεσε σκεύασμα, επί 15 λεπτά. Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και παπούτσια.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Θεϊκή Ατροπίνη.

Αν εμφανιστούν προειδοποιητικά συμπτώματα, να χορηγηθούν αμέσως σε λίγο νερό, 2 αμπούλες θεϊκή ατροπίνη του 0.5 mg και μετά, 1 αμπούλα κάθε 10-15 λεπτά μέχρι να στεγνώσει ο λαιμός και το δέρμα να γίνει στεγνό και κοκκινωπό. Να συνεχιστεί με όσες αμπούλες χρειάζονται για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση ώπου να φθάσει ο γιατρός.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ:

Προειδοποιητικά συμπτώματα: Η δηλητηρίαση από οξαμύλ προκαλεί συμπτώματα αναστολής της χοληνεστεράσης (αδυναμία, ιδρώτα τάση λυποθυμίας, θαμπή όραση, κεφαλόπονο, κλείσιμο της κόρης, αργό σφυγμό, αναούλα, εμετό, βάρος στο στήθος, κοιλιακές συσπάσεις, τρεμούλα).

Θεραπευτική αγωγή: Διατηρείστε πλήρη ατροπονισμό με 1,2-2 mg θεϊκή ατροπίνη ενδοφλεβίως κάθε 10-30 λεπτά μέχρι ο παθόντας να αναλάβει. Ισως χρειαστεί και τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο. Αποκλείστε έκθεσή του σε οποιοδήποτε άλλο αναστολέα της χοληνεστεράσης μέχρι να γίνει τελείως καλά. Μη χρησιμοποιείτε Μορφίνη ή 2-PAM.

ΤΗΛ: ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διασυστηματικό καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο με διπλή δράση (επαφής και στομάχου). Δρά στο νευρικό σύστημα λόγω αναστολής της ακετυλοχολινεστεράσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή στο έδαφος: Πριν τη φύτευση ή κατά τη φύτευση/μεταφύτευση με χρήση μηχανικών μέσων που συνδέονται με τρακτέρ. Μετά την εφαρμογή οι κόκκοι πρέπει να ενσωματώνονται στο έδαφος σε βάθος έως 10 εκ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλύνετε σχολαστικά τον εξοπλισμό εφαρμογής χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Ο καθαρισμός να μην πραγματοποιείται σε κλειστούς χώρους, κοντά σε πηγάδια, υδάτινα/ες ρεύματα/επιφάνειες, δένδρα ή καλλιέργισμα εδάφους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο βυτίο εφαρμογής και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πατάτα - Πρώιμη πατάτα:

Για την αντιμετώπιση των νηματωδών των γενών: *Heterodera* sp., *Globodera* sp.

Δόση σκευάσματος: 4-5,5 κιλά/στρέμμα.

Χρόνος εφαρμογής: Σκόρπισμα σε ολόκληρη την επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 10 εκ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ έτος: 1.

Καρότο:

Για την αντιμετώπιση των νηματωδών του γένους: *Meloidogyne* sp.

Δόση σκευάσματος: 2,5 κιλά/στρέμμα.

Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή σε λωρίδες ή στο αυλάκι κατά τη μεταφύτευση.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ έτος: 1.

Τομάτα, Μελιτζάνα (θερμοκηπίου και υπαίθρου με την προϋπόθεση εδαφοκάλυψης με αδιαφανές πλαστικό):

Για την αντιμετώπιση των νηματωδών του γένους: *Meloidogyne* sp.

Δόση σκευάσματος: 4,5-5,5 κιλά/στρέμμα.

Χρόνος εφαρμογής: Σκόρπισμα σε ολόκληρη την επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 10 εκ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ έτος: 1.

Για την αντιμετώπιση των νηματωδών του γένους: *Meloidogyne* sp.

Δόση σκευάσματος: 3 κιλά/στρέμμα.

Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή σε λωρίδες ή στο αυλάκι.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ έτος: 1.

Παρατηρήσεις:

- 1) Η ομοιόμορφη κατανομή των κόκκων στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους έως 10 εκ. είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου των νηματωδών.
- 2) Οι μεγαλύτερες δόσεις του εύρους να χρησιμοποιούνται σε βαριά εδάφη ή σε περιπτώσεις βαριάς προσβολής.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

120 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος στο έδαφος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ

- Να μην εφαρμόζεται με το χέρι αλλά μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων (μηχανικά μέσα που συνδέονται με τρακτέρ).
- Ο χρήστης κατά το άνοιγμα των συσκευασιών και το γέμισμα του εξοπλισμού εφαρμογής να φοράει γάντια νιτρίλου και να μην εφαρμόζει το σκεύασμα σε έκταση μεγαλύτερη από 50 στρ/ανά ημέρα.
- Να μην υπερβαίνεται η δοσολογία που αναφέρεται στο φάσμα δράσης στην ίδια καλλιέργεια/χωράφι το χρόνο με αυτό ή άλλο προϊόν που έχει οξαμύλ.

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας

1. Να γίνεται κατάλληλη εναλλαγή καλλιιεργειών.
2. Ο εξοπλισμός εφαρμογής να είναι σωστά βαθμονομημένος ώστε να διασφαλίζεται η σωστή δοσολογία.
3. Να χρησιμοποιούνται κατάλληλες ποικιλίες σε σχέση με την ευαισθησία τους στους νηματωδείς.
4. Να γίνεται εναλλαγή με νηματωδοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

- Πατάτα πρώιμη: 84 ημέρες
- Καρότο: 75 ημέρες
- Λοιπές καλλιέργειες: μη εφαρμόσιμο

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα.



3 576960 069090

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

K-47239/2010 - GREECE