



Vydate[®]
MAX

ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ**



CORTEVA[™]
agriscience

Vydate[®]

MAX

ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ



Oxamyl



Καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο, επαφής και στομάχου, φυλλώματος και εδάφους, με διπλή δράση (ανοδική και καθοδική), προϊόν έρευνας της Du Pont.


Τρόπος δράσης

Το oxamyl αναστέλλει τη δράση του ενζύμου που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των νευρικών ερεθισμάτων στο μετασυναπτικό νεύρο, την ακετυλοχολινεστεράση, με αποτέλεσμα υπερδραστηριότητα, αποσυντονισμό, σπασμούς, παράλυση και τελικά τον θάνατο των νηματωδών.

Κύρια χαρακτηριστικά

Δράση του oxamyl στην ακετυλοχολινεστεράση (AChase)

- Άριστη αποτελεσματικότητα στους νηματώδεις.
- Μεγάλης διάρκειας προστατευτική δράση.
- Δεν χρειάζεται βροχή ή άρδευση.
- Δεν επηρεάζει τα ωφέλιμα έντομα (εφαρμογή στο έδαφος).
- Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
- Δεν αφήνει υπολείμματα στα συγκομιζόμενα προϊόντα και στα προϊόντα μεταποίησης.
- Ιδανικό για προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης (IPM) και διαχείρισης (ICM).



Post-synaptic nerve

● ACh

● AChase

● Inactivated ACh



Vydate® MAX

Ένα προϊόν για την καταπολέμηση των νηματωδών (κυστονηματωδών, εξοιδηματικών και ελεύθερων).

Σύνθεση, Μορφή

Το Vydate® Max διατίθεται σε μορφή κόκκων προσφέροντας ασφάλεια και ευκολία στον χρήστη (δεν δημιουργεί σκόνη, δεν περιέχει διαλύτες, μένει σταθερό κατά την αποθήκευση).

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ κιλά/στρ.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΕΤΟΣ
Πατάτα Πρώιμη Πατάτα	Νηματώδεις <i>Heterodera</i> sp. <i>Globotera</i> sp.	4 - 5,5	Σκόρπισμα σ' ολόκληρη την επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 10 εκ.	1
Καρότο	Νηματώδεις <i>Meloidogyne</i> sp.	2,5	Εφαρμογή σε λωρίδες ή στο αυλάκι κατά τη μεταφύτευση.	1
Μελιτζάνα, Τομάτα (Θερμοκηπίου και υπαίθρου με την προϋπόθεση εδαφοκάλυψης με αδιαφανές πλαστικό)	Νηματώδεις <i>Meloidogyne</i> sp.	4,5 - 5,5	Σκόρπισμα σ' ολόκληρη την επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 10 εκ.	1
		3	Εφαρμογή σε λωρίδες ή στο αυλάκι.	

Παρατηρήσεις:

- 1) Η ομοιόμορφη κατανομή των κόκκων στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους έως 10 εκ. είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου των νηματωδών.
- 2) Οι μεγαλύτερες δόσεις του εύρους να χρησιμοποιούνται σε βαριά εδάφη ή σε περιπτώσεις βαριάς προσβολής.

Συσκευασία: Χάρτινο κουτί 10 κιλών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πρώιμη Πατάτα	84
Καρότο	75
Λοιπές καλλιέργειες	Μη εφαρμόσιμο

3 καλοί λόγοι για να επιλέξετε το Vydate® Max

1. Για τον τρόπο δράσης του

- Δρα διασυστηματικά.
- Έχει μεγάλη υπολειμματική διάρκεια (7 εβδομάδες).
- Δεν χρειάζεται άρδευση ή βροχή για να δράσει.
- Αυξάνει την παραγωγή ακόμα και όταν δεν υπάρχει προσβολή γιατί αυξάνει την φωτοσύνθεση και καθυστερεί τη γήρανση των φυτών.

2. Για την ασφάλεια που παρέχει

- Στο χρήστη
- Στις καλλιέργειες

3. Για τη συμβατότητά του με προγράμματα IPM/IC

Τρόπος εφαρμογής

Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος 10 cm ή στη γραμμή σποράς ή στην αυλακιά.

Φάσμα δράσης

Το oxamyl καταπολεμά κυστονηματώδεις, εξοιδηματικούς και ελεύθερους νηματώδεις.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Vydate® MAX Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 3070/ 06.02.2020

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυλλάδιο προορίζονται μόνο για ενημέρωση.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Φεβρουάριος 2021

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 Corteva



CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280

152 32 Χαλάνδρι

T: 210 6889717 | www.corteva.gr