



Vydate[®]

10SL

ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ

**ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ
ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ**



CORTEVA[™]
agriscience

Vydate®

10SL

ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ



Το **Vydate® 10 SL** είναι ένα επαφής και στομάχου, καρβαμιδικό νηματώδοκτόνο. Παγκόσμια είναι εγκεκριμένο σε περισσότερες από 80 χώρες και σε πάνω από 50 καλλιέργειες, για τον έλεγχο 100 εχθρών και πλέον.

Περιγραφή σκευάσματος

Το **Vydate® 10 SL**:

- Είναι υγρό.
- Περιέχει σε ποσοστό 10% (β/ο) τη δραστική ουσία οξαμυλ, που ανήκει στην ομάδα των καρβαμιδικών νηματώδοκτόνων.
- Στην Ελληνική αγορά είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες του 1L και 5L.

Κατηγορία και τρόπος δράσης

Το **Vydate® 10 SL** με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι αποτελεσματικό σε 2 είδη νηματωδών, το *Pratylenchus spp.* και το *Meloidogyne spp.*

Δράση στους Νηματώδεις

Η δράση ενάντια στους νηματώδεις επιτυγχάνεται:

- είτε μέσω της κίνησης του **Vydate® 10 SL** στο έδαφος (επαφής)
- είτε μέσω της διασυστηματικής του κίνησης στους ιστούς της ρίζας από όπου τρέφονται οι νηματώδεις (στομάχου).

Στις προτεινόμενες από την ετικέτα δόσεις το **Vydate® 10 SL** δρα ως νηματωστατικό διαταράσσοντας:

- την τροφική δραστηριότητα
- την κίνηση
- την αναπαραγωγή των νηματωδών
- επίσης, παρεμποδίζει την εκκόλαψη των αυγών και κυστών σε αρκετά είδη.



Φάσμα δράσης

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΕΧΘΡΟΣ - ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ λίτρα (L)/ στρ.	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Τομάτα, Μελιτζάνα (Θ & Υ)*	Νηματοδεις <i>Meloidogyne sp.</i>	1 - 2	Στη μεταφύτευση.	1
		1	Ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση) με τελευταία εφαρμογή έως 42 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.	1-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Πιπεριά (Θ & Υ)*	Νηματοδεις <i>Meloidogyne sp.</i>	1 - 2	Στη μεταφύτευση.	1
		1	Ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση) με τελευταία εφαρμογή έως 28 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.	1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αγγούρι (Θ & Υ)*	Νηματοδεις <i>Meloidogyne sp.</i>	1 - 2	Στη μεταφύτευση.	1
		1	Ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση).	1
Πεπόνι Καρπούζι (Θ & Υ)*	Νηματοδεις <i>Meloidogyne sp.</i>	1 - 2	Στη μεταφύτευση.	1
		1	Ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση).	1
Μπανάνα (αγρού)	Νηματοδεις <i>Meloidogyne sp.</i> <i>Pratylenchus spp.</i>	1	Έως το 50% των τσαμπιών να φτάσει το μέγιστο πάχος των φρούτων.	1 - 3

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Καλλιέργειες	Ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα	28
Πιπεριά	35
Αγγούρι	50
Μπανάνα	7
Πεπόνι, Καρπούζι	50

Παρατηρήσεις:

Οι εφαρμογές για την αντιμετώπιση των νηματωδών έχουν δευτερεύουσα δράση και σε αλευρώδεις/αφίδες.

*Με την προϋπόθεση εδαφοκάλυψης με αδιαφανές πλαστικό.

Τρόπος εφαρμογής

Το Vydate® 10 SL διοχετεύεται στο νερό ποτίσματος και διανέμεται στο έδαφος μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης.


Η οριζόντια και κάθετη κατανομή του στο έδαφος εξαρτάται από:

- τον τύπο του εδάφους
- το ύψος του νερού ποτίσματος
- το χρόνο εισαγωγής του κατά την άρδευση

Εφαρμόζοντας το πλήρες πρόγραμμα ψεκασμών ανά καλλιέργεια επιτυγχάνουμε:

- Προστασία των φυτών κατά την ευαίσθητη περίοδο της αρχικής ανάπτυξής τους.
- Διατήρηση μιας σταθερής ποσότητας Vydate® 10 SL στις ρίζες για το συνεχή έλεγχο νηματωδών
- Καλύτερη προστασία των φυτών καθώς οι εφαρμογές ξεκινούν πριν τη εκδήλωση σοβαρών προσβολών.

Προφίλ κατανομής του Vydate® 10 SL στο έδαφος & γύρω από τη ρίζα μετά την εφαρμογή του με στάγδην άρδευση



Για να αποφύγουμε την έκπλυσή του και να εξασφαλίσουμε τη σωστή κατανομή γύρω από την ρίζα συνιστάται η εφαρμογή του να γίνεται κατά προτίμηση λίγο πριν το τέλος της άρδευσης, φροντίζοντας να υπολείπονται 2-3 λεπτά άρδευσης με καθαρό νερό ώστε να καθαρίζεται το σύστημα άρδευσης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4 sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Vydate® 10SL Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας (ΑΕΚ): 3.054/4.10.2013

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυλλάδιο προορίζονται μόνο για ενημέρωση.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Φεβρουάριος 2021

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 Corteva



CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS A.E.

Υδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280

152 32 Χαλάνδρι

T: 210 6889717 | www.corteva.gr