



ZORVEC™
Vinabel™ 340 SE

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Γαλακτώδες αιώρημα (SE)

Εγγυημένη σύνθεση:

Oxathiapiprolin 4% β/ο

Zoxamide 30% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 66,94 % β/β

Μυκητοκτόνο με προληπτική-προστατευτική δράση,
μείγμα δύο δραστικών ουσιών για τον έλεγχο του
περονόσπορου στο αμπέλι.

™* Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience
και των συνδεδεμένων εταιρειών της.



100 ML

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Α.Α.Δ.Α.: 60975/21.07.2020

Κάτοχος της Άδειας, Υπεύθυνος Επικοινωνίας και
για την τελική Διάθεση στην Αγορά:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 688 9700

Περιεχόμενο: 100 ml
Αρ. παρτίδας - Ημ/νία παρασκευής-

K-47458/2101 - GREECE

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική
αντίδραση.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.



Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο.
Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή στην καλλιέργεια. Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Πρώτες βοήθειες:

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

50X20MM MINIMUM

NO TEXT NO COLOR ON THIS ZONE

(THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο.

Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

ΜΗ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης, άρδευσης και δρόμων.)

Για την προστασία υπόγειων υδάτων μην εφαρμόζετε σε εδάφη που περιέχουν περισσότερο από 80% άμμο.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα: μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** ή μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μυκητοκτόνο με προληπτική-προστατευτική δράση, μείγμα δύο δραστικών ουσιών. Η δραστική ουσία oxathiapirrolin δρα ως ρυθμιστής δέσμευσης της οξυστερόλης (OSBP) στα κύτταρα των μυκήτων. Η δραστική ουσία zoaxamide έχει διαφορετικό τρόπο δράσης, παρεμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση των ωομυκήτων επηρεάζοντας τον πολυμερισμό της β-τουμπουλίνης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Καλλιέργεια: Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες).

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο.

Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων και έως την ολοκλήρωση σχηματισμού των καρπών. **Δόση σκευάσματος:** 50 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/ στρέμμα. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται προληπτικά πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 ανά 10 ημέρες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 28 ημέρες.

- Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε καλλιέργειες που βρίσκονται υπό συνθήκες στρες.

- Το σκεύασμα είναι ανθεκτικό στη βροχή εφόσον αυτή εκδηλωθεί 20 λεπτά αφότου έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φύλλα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα είναι μείγμα δυο δραστικών ουσιών, περιέχει oxathiapirrolin που ανήκει στην ομάδα F9 (κωδικός 49) και zoaxamide ανήκει στην ομάδα B3 (κωδικός 22) κατά FRAC. Το oxathiapirrolin δεν εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με άλλες χημικές ομάδες μυκητοκτόνων συμπεριλαμβανομένων των αμιδιων καρβοξυλικού οξέος (CAA), των φαινυλαμιδιων, του cyproconazole, μυκητοκτόνων QoI, όπως επίσης δεν αναμένεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα με το zoaxamide γνωστό ως αναστολέα της β-τουμπουλίνης. Αφετέρου δεν υπάρχει αποδεδειγμένη διασταυρωτή ανθεκτικότητα μεταξύ του zoaxamide και είτε CAA, φαινυλαμιδιών, QoIs, ή τριαζολών.

- Προτείνεται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης της νόσου και σε κάθε περίπτωση πριν από την εγκατάσταση του παθογόνου στην καλλιέργεια.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο.

Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα κατά το ήμισυ της χωρητικότητάς του με καθαρό νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα Zorvec Vinabel απευθείας στο βυτίο υπό συνεχή ανάδευση και στη συνέχεια συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να είναι υπό συνεχή ανάδευση πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την παρασκευή του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού πρέπει να πλένονται σχολαστικά στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τμήμα τους. Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και απορρυπαντικό. Το νερό του ξεπλύματος να μην ρίχνεται σε ευαίσθητα τμήματα της καλλιέργειας ή σε έδαφος που προορίζεται για κάποια ευαίσθητη καλλιέργεια. Επαναλάβετε τη διαδικασία με καθαρό νερό δύο (2) φορές.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται σταθερό για δυο (2) χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά, κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο.

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο.

Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.