

VOLET INTERNE RECTO (SIDE 7)

σία folpet, η οποία ανήκει στην ομάδα M04 κατά FRAC και τη δραστική ουσία oxathiapirrolin, η οποία ανήκει στην ομάδα 49 κατά FRAC.

- Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- Ακολουθείστε τις οδηγίες της FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) για τις δραστικές ουσίες των ομάδων α) φθαλιμιδικά και β) piperidinyl-thiazole-isoxazoline

Γενικά: Η χρήση μειγμάτων και ιδιαίτερα δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης μειώνει την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας των παθογόνων.

- Προτείνεται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στα πρώιμα

στάδια ανάπτυξης της νόσου και σε κάθε περίπτωση πριν από την εγκατάσταση του παθογόνου στην καλλιέργεια.

Οι εφαρμογές με το ZORVEC VINABRIA ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος περιέχει δραστικές ουσίες της ομάδας των piperidinyl-thiazole-isoxazoline να μην ξεπερνούν τις 2/καλλιεργητική περίοδο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μετά από δύο (2) ημέρες με χρήση γαντιών ή 35 ημέρες χωρίς χρήση γαντιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμί-

(SIDE 1)

στε το δοχείο του ψεκαστήρα κατά το ½ της χωρητικότητάς του με καθαρό νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα ZORVEC VINABRIA 510 SC απευθείας στο βυτίο υπό συνεχή ανάδευση και στη συνέχεια συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού με κοινό απορ-

FACE CACHÉE RECTO (SIDE 2)

ρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Το νερό του ξεπλύματος να μην ρίχνεται σε ευαίσθητα τμήματα της καλλιέργειας ή σε έδαφος που προορίζεται για κάποια ευαίσθητη καλλιέργεια. Επαναλάβετε τη διαδικασία με καθαρό νερό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού με κοινό απορ-

(SIDE 3)

A.A.Δ.A.: 60988/16.10.2020
Κάτοχος της Άδειας, Υπεύθυνος για την Τελική Διάθεση στην Αγορά:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ.: +30 2106889700

Περιεχόμενο:
Αρ. παρτίδας - Ημ/νία παρασκευής-

*TM Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.



K-47430/2101 - GREECE



FACE PRINCIPALE RECTO (SIDE 4)



Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
oxathiapirrolin 1% β/β
folpet 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες 56.6 % β/β
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική-προστατευτική δράση για τον περονόσπορο του αμπελιού.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.



(SIDE 5)



ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει folpet και 1,2-benzisothiazolin-3-one.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

VOLET PRINCIPAL RECTO (SIDE 6)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνεύετε σταγονίδια/ εκνευρώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. Μην τρώτε, πιείτε, ή καπνίσετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση περιεχομένου/περιεκτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
«Φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρομάνικο πουκάμισο κατά την αναμείξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.»
«Μην εισέρχεται στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό και για διάστημα 48 ωρών. Στην περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρομάνικο πουκάμισο και γάντια.»
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλά.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

VOLET PRINCIPAL VERSO (SIDE 8)

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικουσίας μην εφαρμόζετε κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια ή απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνονται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική-προστατευτική δράση για τον περονόσπορο του αμπελιού. Το oxathiapirrolin είναι μυκητοκτόνο νέας γενιάς που δρα ως ρυθμιστής δέσμευσης της οξυστερόλης στα κύτταρα των μυκήτων. Η διελασματική κίνηση του oxathiapirrolin στα φύλλα συμβάλλει στην ομοιόμορφη προστασία. Η διασυστηματική κίνηση



CORTEVATM
agriscience



CORTEVATM
agriscience

VOLET INTERNE VERSO (SIDE 9)

του δραστικού συστατικού μέσω του ξυλώματος, βοηθά στην προστασία τόσο των φύλλων που δεν είχαν πλήρως εκπτυχθεί κατά το χρόνο της εφαρμογής, όσο και της νέας βλάστησης. Το folpet είναι μυκητοκτόνο επαφής ευρέως φάσματος με προληπτική δράση. Απορροφάται ταχέως από το φύλλο και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την σποριογένεση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Καλλιέργεια: Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες).

Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. Εφαρμογές από το ξεδίπλωμα του 3ου φύλλου έως την καρπόδεση. **Δόση σκευάσματος:** 240 κ.εκ./

στρέμμα **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-120 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 ανά 10 ημέρες **Παρατηρήσεις:** 1. Για όγκους ψεκαστικού διαλύματος κάτω από 100 λίτρα/στρ , εφαρμόστε 200κ.εκ σκευάσματος/στρ. Για όγκους ψεκαστικού διαλύματος μεγαλύτερους από 100 λίτρα/στρ, εφαρμόστε 200κ.εκ/100λιτρο. 2. Το σκεύασμα είναι ανθεκτικό στη βροχή εφόσον αυτή εκδηλωθεί 20 λεπτά αφότου έχουν στεγνώσει τα φύλλα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 56 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΟΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ου-