



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2020





ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2020



ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 06

ZIZANIOKTONA 08

Arigo [®] 51 WG	09
Broadway [™] 85 WG	10
Cabadex [®] EXTRA	11
Clincher [™] NEO 200EC	12
Corello [™] 75WG	13
Crossbow [™] 600EC	14
Garlon [™] DUO 270EW	15
Hector [®] MAX WG	16
Kerb [™] FLO 400SC	17
Lancelot [™] 450WG	18
Lontrel [™] 720 SG	19
Mustang [™] 306SE	20
Pindar [®] OD	21
Primus [®] PERFECT	22
Principal [®]	23
Rush [®] WG	24
Symbol [™] SC	25
Viper [™] MAX OD	26
Viper [™] OD	27

ENTOMOKTONA 28

Delegate [™] 250 WG	29
Eskif [™] 120 SC	30
Flash [™] 120SC	31
Jerdez [™] 500WG	33
Laser [™] 480SC	34
Onore [™] 240SC	36
Success [™] 0,24CB	37

ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΑ 38

Vydate [®] 10SL	38
Vydate [®] MAX 10G*	39

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ 40

Alper [®] Plus 4,5/68WG	41
Curzate [®] 60WG	42
Equation [®] CORE WG*	43
Fontelis [®] 20SC	44
Karathane [™] R*	46
Sirocco [®] M44 WP	47
Staba [™] 5 EW	48
Sythane [™] ULTRA 45EW	49
Talendo [®] 20EC	50

ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ 51

Codacide EC	51
Surfer [™] SL	51
Trend [®] 90SL	51

ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 52

ΥΒΡΙΔΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 54

P1921	55
P1758	55
PR31Y43	56
P2105	56
P1916	56
P1772 NEO	57
P2085 NEO	57
P1570	57
P1524	58
P1672	58
P1565	58
P1611	58
P1454 NEO	59
P1049	60
P0729	61
P0937	61
P0023	61
P9911	62
PR31A34	62
P2948W άσπρο καλαμπόκι	62

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 63

ST 318	64
ST 402	64
ST 405	65
ST 373	65
ST 457	65
ST 474	66
ST 463	66
IDEAL	66

ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 67

P64LE99	68
P64LE25	68
P63LE113	69
P64LE136 NEO	69
P64LC108	70
P64LP130 NEO	70
P64HE118 NEO	71
P64HE133 NEO	71
P64HE144 NEO	71

ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 72

PT264 NEO	73
PT275 NEO	73
PT200 CL	74
PT228 CL	74
PT279 CL NEO	74

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΗΔΙΚΗΣ	75
GIULIA & PR57Q53	76
BLUE MOON	76

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΟΓΙΑΣ	77
PR92B63	78
P21T45	78

ΥΒΡΙΔΙΑ ΣΟΡΓΟΥ	79
PR823F	80
NICOL	80

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ-ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ	81
---	-----------

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ	
ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ACHILLE)	82

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ	
ΛΑΖΑΡΟ (LAZARO)	83
ΑΦΡΙΚΑ (AFRICA)	83

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ	
ΛΟΥΤΕΣ (LUTECE)	84
ΠΛΑΝΕΤ (RGT PLANET)	84

ΥΒΡΙΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ..	85
DEXTER F1	86
FABER F1	86
ISI 23804 F1	86
FOSTER F1	87
VOLARE F1	87
SAILOR F1	87

ΣΠΟΡΟΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ.....88

ΥΒΡΙΔΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ..	90
EXESIA F1	91
BOTERO F1	91
ROSALINDA F1	91
NICAREDDHU F1	92
KARDOULA F1	92
TRILLY F1	92
ISI 82360 F1	93
PROXY F1	93
SALADYN F1	93
BLONDY F1	94
MELANGE F1	94
DOLLY F1	94

ΥΒΡΙΔΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ	95
ACROPOL F1	96
NEFELI F1	96
KARYATIS F1	96

ΥΒΡΙΔΙΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ	97
KALISTO F1	97

ΥΒΡΙΔΙΟ ΓΛΥΚΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ	98
THISEAS F1	98

ΚΟΝΤΟ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ	99
14C2527 F1 NEO	99

ΥΒΡΙΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ	
ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΓΟΡΑ	100
SCOOTER F1	101
BOGART F1	101

ΥΒΡΙΔΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ	102
SARATOGA	103
KHROMA F1	103
AURORA F1	103
MORADA DE AMPOSTA	103

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 104

FERTIBEST	106
-----------------	-----

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ..... 108



ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ





ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ.
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

ZIZANIOKTONA

Arigo® 51 WG	09	Lontrel™ 720 SG.....	19
Broadway™ 85 WG	10	Mustang™ 306SE	20
Cabadex® EXTRA	11	Pindar® OD	21
Clincher™ NEO 200EC	12	Primus® PERFECT.....	22
Corello™ 75WG	13	Principal®	23
Crossbow™ 600EC.....	14	Rush® WG	24
Garlon™ DUO 270EW.....	15	Symbol™ SC	25
Hector® MAX WG	16	Viper™ MAX OD	26
Kerb™ FLO 400SC.....	17	Viper™ OD	27
Lancelot™ 450WG.....	18		

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση αγρωστών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ					
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΧ ΓΡ. ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ (ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡ.)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΥΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ για καρπό και ενσίρωση	Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια	33 + επιφανειοδραστικό	20-40	BBCH 12 - 18 Όταν ο αραβόσιτος έχει 2-8 φύλλα	1 έως 2* Σε περίπτωση κλιμακωτής φύτευσης, πραγματοποιήστε μία πρώτη εφαρμογή με Arigo® σε δόσολογία 16,5 g/ ανά στρέμμα, που ακολουθείται από μία συμπληρωματική εφαρμογή σε δόσολογία 16,5 g/ ανά στρέμμα, χωρίς όμως η συνολική δόσολογία του Arigo® να ξεπεράσει τα 33 g/ ανά στρέμμα. Στην περίπτωση αυτή, αφήστε να περάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα ανάμεσα στις δύο εφαρμογές.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Αγρωστώδη (στο στάδιο 1 φύλλο έως 3 φύλλα)

Άγρια βρώμη, Πάνικο το κεχροειδές, Κοινή πόα, Ήρα πολυετής, Σετάρια η γλαυκόχρους, Πάνικο διχοτομικό, Μουχρίτσα, Σετάρια πράσινη, Σπονδυλωτή σετάρια.

Ετήσια δικοτυλήδονα

(στο στάδιο Κοτυληδόνα έως 2 - 4 φύλλα)

Στριγγλόχορτο, Αγριοκαρδαμούρα, Τάτουλας, Γαλινσόγκα, Χαμομήλι, Στύφνος, Αγριοραπανίδα, Λαπάτσα, Αγριοπιπεριά, Αναβλάστηση ελαιοκράμβης, Αναβλάστηση ηλίανθου, Αγριοσινάπι, Μαρτιάκος, Στελλάρια, Βερόνικα η περσική, Τραχύ βλήτο, Κλουβίδα, Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα, Γεράνιο, Πορφυρό λάμιο Τραχύς ζωχός, Σκαρολάχανο, Άγρια σίκαλη, Θλάσι.

Διετή ή Πολυετή (στο στάδιο 20-30 cm)

Άγρωστη η σπονδυλωτή, Βέλιουρας, Πολυετής ζωχός, Αγριάδα.

Μετρίως ευαίσθητα

Αγριομελιτζάνα, Πολυκόμμι, Γαϊδουράγκαθο.

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

nicosulfuron 12% (β/β)
rimsulfuron 3% (β/β)
mesotrione 36% (β/β)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

εναιωριματοποιήσιμοι
κόκκοι (WG)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛ.: 70175/12.10.2016
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ιζανιοκτόνο, με διασυστηματική δράση για τον έλεγχο πλατυφύλλων και αγρωστώδων ζιζανίων. Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα. Αναστέλλει τη δράση του ενζύμου οξεικογαλακτική συνθετάση (acetolactate synthase – ALS. Μεταφέρεται γρήγορα διαμέσου του ηθμώδους και ξυλώδους ιστού στα μεριστωματικά κύτταρα του φυτού. Η ανάπτυξη του φυτού μειώνεται μετά από λίγες ώρες, αν και οι τελικές επιπτώσεις χρειάζονται μερικές εβδομάδες για να φανούν.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα		
Σιτάρι σκληρό και μαλακό	Πλατύφυλλα και Αγρωστώδη ζιζάνια	26,5	-	10-40 Ο μικρότερος όγκος να χρησιμοποιείται μόνο σε μικρά ζιζάνια και προτού κλείσει η καλλιέργεια.	Ψεκαστήρας εφαρμοσμένος σε ελκυστήρα. Εφαρμογή από την αρχή του αδελφώματος μέχρι και το στάδιο του 2 ^{ου} γόντατου.	1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Αγρωστώδη:

Ευαίσθητα: Αλεπονουρά, Ήρα

Μέτρια Ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, Βρώμος

Πλατύφυλλα:

Ευαίσθητα: Κολλητσίδα, Χαμομήλι, Καφέλα, Σινάπι, Στελλάρια,

Κολλητσίδα, Ραπανίδα, Αγριόβικος, Βερόνικα, Αγριοπανσές.

Μέτρια Ευαίσθητα: Παπαρούνα, Πολυκόμπι, Φαλάρης.

ΣΥΣΤΑΣΗ:

pyroxsulam 7,1% β/β
 florasulam 1,4% β/β
 περιέχει τον αντιφυτοτοξικό παράγοντα
 cloquintocet-mexyl 7,1% β/β

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

εναιωριματοποιήσιμοι
 κόκκοι (WG)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛ.: 7967/28.12.2011
 ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το florasulam είναι αναστολέας του ενζύμου ALS (acetolactate synthase). Προκαλεί αναστολή της ανάπτυξης των ζιζανίων. Ορατά συμπτώματα εμφανίζονται μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την εφαρμογή. Καταστροφή των ευαίσθητων ειδών επέρχεται μέσα στις επόμενες 1 έως 8 εβδομάδες ανάλογα με τις καλλιεργητικές συνθήκες. Το mesotrione ανήκει στην ομάδα των τρικετονών που παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτ. νερό	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Αραβόσιτος	Πλατύφυλλα Ζιζάνια: Λουβουδιά, Βλήτο τραχύ, Αγριομελιτζάνα, Αγριοτοματιά Αγριοβαμβακιά,* Βλήτο πλαγιαστό*	45	-	30-40	Προφυτρωτική εφαρμογή. Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά έως και το φύτευμα του αραβοσίτου (από 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου). (BBCH 00-09).	1
		30**			Ή Μεταφυτρωτική εφαρμογή. Από το στάδιο των 2 φύλλων έως τα 6 φύλλα (από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου). (BBCH 12-16).	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

* Τα ζιζάνια Αγριοβαμβακιά και Βλήτο πλαγιαστό καταπολεμούνται **μόνο** με την μεταφυτρωτική εφαρμογή.

** Στην μεταφυτρωτική χρήση συστήνεται συνδυασμός στο ψεκαστικό διάλυμα με επιφανειοδραστικά σκευάσματα Polyglycol 26-2 (που περιέχουν Alkylphenol alkoxylate (CAS 69029-39-6) > 99%) με δόση (0,2% ο/ο ή 50 κ.εκ./στρ.), για καλύτερη αποτελεσματικότητα.

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

florasulam 1,67 % (β/ο)
mesotrione 26,7 % (β/ο)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

πυκνό εναιώρημα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ


Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των αρυλο-φαινοξυ-προπιονικών οξέων για την καταπολέμηση υδροχαρών ζιζανίων στο ρύζι. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων με δράση στην καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α. Η ανάπτυξη του φυτού επιβραδύνεται μόλις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή, παρόλο που τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται 2-3 ημέρες αργότερα, ενώ για το τελικό αποτέλεσμα απαιτείται περίπου μία εβδομάδα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ. / στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ρύζι	Ευαίσθητα ζιζάνια: μουχρίτσα, λεπτοκλόα, πάνικο - κεχρί, νεραγριάδα Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: αιματόχορτο, σετάρια	100-150		15-40	Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια έχουν 1-4 φύλλα (BBCH 11-14) και το ρύζι βρίσκεται σε στάδιο από 1 φύλλο μέχρι το τέλος του αδερφώματος (BBCH 11-29).	1

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Ρύζι	60

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:
cyhalofop-butyl: 20% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
υγρό γαλακτωματοποιίσιμο (EC)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 70042/15.5.2013
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Το CORELLO™ 75WG είναι διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι. Δρα ως αναστολέας του ενζύμου acetolactate synthase (ALS) (οξυγαλακτική συνθεάση) εμποδίζοντας τη σύνθεση αμινοξέων των ζιζανίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΥΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		γρ. σκ. / στρ.	όγκος ψεκ. υγρού λιτρά / στρ.		
Σιτάρι (μαλακό, σκληρό)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20-25	10-40	Σιτάρι: Με την εμφάνιση 1ου αδελφίου ως την εμφάνιση του 1ου κόμβου, (BBCH 21-31) Ζιζάνια: Για τα αγρωστώδη στο στάδιο των 3-5 φύλλων και για τα πλατύφυλλα από το στάδιο 2-4 φύλλα έως 6-8 φύλλα.	1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ*Ετήσια Αγρωστώδη:**

Ευαίσθητα:

- Αγριοβρώμη
- Αλεπονουρά
- Ήρα
- Βρώμος

Μετρίως ευαίσθητα:

- Φαλαρίδα

Ετήσια Πλατύφυλλα:

Ευαίσθητα:

- Ανθεμίδα
- Σινάπι

Μετρίως ευαίσθητα

- Κολλητσίδα
- Χαμομήλι

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Σιτάρι	60

ΣΥΝΘΕΣΗ:

pyroxsulam: 7,5% (β/β)
Ανιφυτοτοξικός παράγοντας:
cloquintocet-mexyl: 7.5% (β/β)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

εναιωρηματοποιήσιμοι
κόκκοι (WG)

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 70361/20.11.2019
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για των έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσιτου. Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και των ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ					
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ./ στρ.	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Σιτάρι Κριθάρι	Πλατύφυλλα ζιζάνια*	50-100	20-40	Μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.	1
Αραβόσιπος	Πλατύφυλλα ζιζάνια*	50-100	20-40	Μεταφυτρωτική εφαρμογή στο στάδιο 3-6 φύλλων του αραβόσιπου και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.	1

*ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Ευαίσθητα ζιζάνια

Αγριομπαμπακιά, Αναγαλλίδα, Τραχύ βλήτο, Μπιφόρα, Λου-βουδιά, Κίρσιο, Περιπλοκάδα, Δωδεκάνθι, Κοινή παπαρούνα, Ραπανίδα, Άγριο σινάπι, Αγριοντοματιά.

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Τάτουλας, Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα, Πολυκόμπι, Αγριοπιπε-ριά, Βερόνικα.

Παρατήρηση

Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΡΗΙ(ΗΜΕΡΕΣ)
Σιτάρι Κριθάρι	60
Αραβόσιπος	Μη εφαρμόσιμο

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

2,4-D οξύ: 60% β/ο
{υπό μορφή 2,4-D
αίθυλο έξιλο εστέρας (ΕΗΕ)}

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

γαλακτωματοποιίσιμο
υγρό (EC)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΕΚ): 7995/29.10.2012
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: DOW AGROSCIENCES ITALIA SRL.

Το GARLON™ DUO είναι ένα ζιζανιοκτόνο που δρά από φυλλώματος για μακροχρόνιο έλεγχο ετησίων και πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων (herbaceous και ξυλώδων/ημι-ξυλώδων) σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις. Και τα δύο δραστικά συστατικά triclopyr & aminopyralid ανήκουν στην ομάδα ζιζανιοκτόνων του pyridine carboxylic acid. Απορροφώνται γρήγορα από τα φυτά και μεταφέρονται, για να συσσωρευτούν στο μεριστωματικό ιστό. Στα ευαίσθητα είδη και τα δύο δραστικά συστατικά προκαλούν συμπτώματα αυξίνων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ. / στρέμμα (max)	λτ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μη καλλιεργούμενες εκτάσεις	Ετήσια και πολυετή ποώδη πλατύφυλλα ζιζάνια	150-200		20-40	Καθολική εφαρμογή σε ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια	1
	Θαμνώδης βλάστηση, ξυλώδη και ημι-ξυλώδη είδη.		0.8-1		Στοχευμένη εφαρμογή σε ενεργά αναπτυσσόμενους θάμνους και ξυλώδη είδη από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Αυγούστου.	

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Ετήσια και πολυετή ποώδη πλατύφυλλα ζιζάνια:

Ευαίσθητα: Αμβρόσια, Περιπλοκάδα μεγάλη, Κεντάurio, Κίρσιο, Περιπλοκάδα, Κόνυζα, Erigeron Annuus, Βελονάκι, Κολλητσιίδα μεγάλη, Γεράνι, Χοιροβότανο, Πεντάνευρο, Λάπαθο μεγάλο, Άγριο τρυφύλλι, Πολυετής Τσουκνίδα.

Μετρίως ευαίσθητα: Αχίλλεια, Αγριοράδιο.

Θαμνώδης βλάστηση και ξυλώδη είδη:

Ευαίσθητα: Ακακία μιμόζα, Αγράμπελη, Κράταιγος, Κρασιά, Κύνισος, Φλαμουριά, Τσαπουρνιά, Αγριοκερασιά, Ακακία, Βάτος, Ούλεξ.

Μετρίως ευαίσθητα: Ρείκι, Ευκάλυπτος, Ποτεντίλλα, Πουρνάρι.

Τα στενόφυλλα φυτά είναι ανθεκτικά στο Garlon Duo.

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:
aminopyralid 3% β/ο
+ triclopyr 24% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
γαλακτωματοποιήσιμο,
λάδι σε νερό (EW)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 70088/7.7.2014
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ					
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ Κ. ΕΚ./ ΣΤΡΕΜΜΑ	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ (ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡ.)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦ/ΓΩΝ/ ΚΑΛ. ΠΕΡΙΟΔΟ
Αραβόσιτος	Αγρωστώδη ζιζάνια Αλωπέκουρος, Βρώμη, Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Ήρα, Πάνικο, Κεχρί, Φαλαρίς, Σετάρια, Βέλιουρας σε σπόρο ή ρίζωμα, Πόα Πλατύφυλλα ζιζάνια Αγριοβαμβακιά, Βλήτα, Αμβροσία, Ασπροκέφαλος, Forbicine, Καψέλα, Περιπλοκάδι, Λουβουδιά, Βρωμολουβουδιά, Περικοκλάδα, Διπλόταξη, Καπνόχορτο, Κολοκάσι, Χαμομήλι, Σκαρόχορτο, Λαπάτσα, Αγριοπιπεριά, Ραφανίδα, Νερατζούλα, Ράπιστρο, Αγριοσινάπι, Αγριοντοματιά, Ζωχός, Στελάρια Αγριομελιτζάνα, Τάτουλας	35 - 44 (3)	20-40	Όταν ο αραβόσιτος έχει 2-6 φύλλα (1)	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο της ζωνής ανάπτυξής τους. Η μικρότερη δόση συνιστάται επί μονοετών αγρωστωδών και δικοτυλήδων ζιζανίων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη δόση συνιστάται σε πολυετή ζιζάνια, μονοετή ζιζάνια ήδη ανεπτυγμένα καθώς και στο ζιζάνιο *Digitaria spp.* (Αιματόχορτο).
2. Το ζιζάνιο *Solanum nigrum* (Αγριοντομάτα) είναι μετρίως ευαίσθητο.
3. Κατά τον ψεκασμό συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ' όγκο ή προσκολλητικού CODACIDE EC σε δόση 125 κ.εκ./στρέμμα.

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

nicosulfuron 9,2% (β/β)
rimsulfuron 2,3% (β/β)
dicamba 55% (β/β)
(υπό μορφή άλατος νατρίου)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 70053/31.07.2013
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: NTY PONT ELLAS A.E.

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τις ρίζες και μετακινείται αποπλάστικα. Η ζιζανιοκτόνος δράση του οφείλεται στην παρεμπόδιση του πολυμερισμού της τουμπουλίνης με αποτέλεσμα την αναστολή της αύξησης του ριζικού συστήματος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή
		κ.εκ. σκ./στρ.	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα			
Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά/Καρυδιά/Καστανιά	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	20-40	Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά.	1	Μη εφαρμόσιμο
Μηλοειδή: Μηλιά/Αχλαδιά/Κυδωνιά	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	20-40	Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά.	1	Μη εφαρμόσιμο
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά/Βερικοκιά Δαμασκηνιά/Κερασιά	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	20-40	Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά.	1	Μη εφαρμόσιμο
Αμπέλι	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	20-40	Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά.	1	Μη εφαρμόσιμο
Μπρόκολο/Λάχανο	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	250	20-40	α) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά β) αμέσως μετά τη μεταφύτευση.	1	60 ημέρες
Κουνουπίδι	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	375	20-40	α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά γ) αμέσως μετά τη μεταφύτευση	1	60 ημέρες
Μαρούλι	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	375	20-40	α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά επιφανειακά γ) αμέσως μετά τη μεταφύτευση.	1	28 ημέρες
Ραδίκι	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	375	20-40	Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο.	1	Μη εφαρμόσιμο
Αντίδι	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	375	20-40	α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά.	1	28 ημέρες
Φασολάκια νωπά	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	20-40	α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά	1	90 ημέρες
Αγκινάρα/Αγρια αγκινάρα	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	375	20-40	Μεταφυτρωτικά στην έναρξη ανάπτυξης βλαστού.	1	60 ημέρες/ 120 ημέρες
Φακή	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	20-40	α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά.	1	90 ημέρες
Ηλιάνθος	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	20-40	α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά	1	Μη εφαρμόσιμο
Ελαιοκράμβη	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	20-40	Μετά το στάδιο των 2-4 φύλλων.	1	Μη εφαρμόσιμο
Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι	Κουσκοῦτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	375	20-40	Εφαρμόζεται στις γραμμές φύτευσης ή στο 50% της επιφάνειας του εδάφους.	1	Μη εφαρμόσιμο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* Καταπολεμώμενα ζιζάνια:

Πλατύφυλλα: Κουσκοῦτα, Πολυκόμμι, Αγριοπιπεριά, Λουβουδιά, Βερόνικα, Αντράκλα.

Αγρωστώδη: Αλεπονουρά, Μουχρίσα, Κοινή πόα.

1. Στα φυλλώδη λαχανικά για την καλύτερη καταπολέμηση της κου-

σκούτας, η δόση μπορεί να αυξηθεί έως τα 500κ.εκ./στρέμμα.

2. **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος KERB FLO 400 SC.**

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

propyzamide: 40% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

πυκνό εναιώρημα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ



Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ					
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		γρ. σκευάσματος / στρ.	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Σιτάρι Μαλακό Σιτάρι Σκληρό Κριθάρι	Πλατύφυλλα ζιζάνια*	3,3	10-40	Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την αρχή του αδελφώματος έως την εμφάνιση του δεύτερου κόμβου, και τα ζιζάνια είναι μέχρι το στάδιο των 6-8 φύλλων BBCH 21-32	1

***ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:**

Ανθεμίδα, Καφέλλα, Αγριομαργαρίτα, Κίραιο, Καπνόχορτο, Μεγαλόκαρπη κολλιτσίδα, Χαμομήλι, Πολυκόμμι, Αναρριχώμενο πολύγωνο, Παπαρούνα, Ραπανίδα, Άγριο σινάπι, Στελλάρια

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΡΗΙ(ΗΜΕΡΕΣ)
Σιτάρι, Κριθάρι	60

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

aminopyralid: 30 % β/β
florasulam: 15 % β/β

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΠΡΟΣΟΧΗ



Το LONTREL™ 720 SG είναι εκλεκτικό διασυστημικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων των οικογενειών Compositae & Leguminosae και ορισμένα είδη των οικ. Solanaceae, Polygonaceae & Umbeliferae. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες ενώ μεταφέρεται τόσο μέσω των ηθμωδών όσο και των ξυλωδών αγγείων. Συγκεντρώνεται δε στους μεριστωματικούς ιστούς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΥΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		γρ. /στρ.	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ζαχαρότευτλα	πλατύφυλλα ζιζάνια	17.4	10-40	Εφαρμογή το αργότερο ως το κλείσιμο των γραμμών (B10-39)	1 ανά 2 έτη
Ελαιοκράμβη εαρινή		17.4		Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση των μπουμπουκιών (B30-51). Εφαρμογές μόνο την άνοιξη.	1
Ελαιοκράμβη χειμερινή		17.4		Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση των μπουμπουκιών (B30-51)	1 ανά 2 έτη
Αραβόσιτος		17.4		Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση 2 κόμβων (B10-32)	1
Σόργο		17.4		Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση 8 φύλλων (B14-18)	1 ανά 2 έτη
Παντζάρι		17.4		Μέχρι το στάδιο BBCH 39 (κλείσιμο των γραμμών)	1 ανά 2 έτη
Δασικές εκτάσεις		17.4			1 ανά 2 έτη
Λινάρι για κλωστουφαντουργεία		17.4			1 ανά 2 έτη
Καλλιέργειες για σποροπαραγωγή (Κρεμμύδι, πράσο, σχοινόπρασο, γογγύλια, ραπανάκι, λάχανο, παντζάρι, σέσκουλο, γαρίφαλα, κόκκινο λινάρι, σπανάκι και ρόκα).		14			1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

ΠΟΛΥΕΤΗ

Κίρσιο, Πικρίς, Λαθούρι, Σοχός, Μηδική, Τριφύλλι

ΕΤΗΣΙΑ

Ανθεμίδα, Κενταύριο, Χρυσάνθεμο, Ντατούρα, Κόνυζα, Γκαλινσογκα, Πικρίδα, Σόχος, Λαμसानα, Χαμομήλι, Σενέκιο, Ηλίανθος, Αγριόβικος

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΡΗΙ(ΗΜΕΡΕΣ)
Ζαχαρότευτλα	42
Ελαιοκράμβη	56
Αραβόσιτος	60 (για ενσίρωση) / 90 (για σπόρο)
Σόργο	42 (για ενσίρωση) / 70 (για σπόρο)
Παντζάρι	42
Δασικές εκτάσεις	-
Λινάρι	42
Καλλιέργειες για σποροπαραγωγή	-

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

clpyralid 72% (β/β)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

ΠΡΟΣΟΧΗ



Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο. Το florasulam ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών-σουλφονιδίων. Αναστέλλει τη δράση του ενζύμου οξεικογαλακτική συνθε-
τάση (acetolactate synthase – ALS). Το 2,4 D ανήκει στην ομάδα των φαινοξυαλκανοϊκών οξέων. Συσσωρεύεται κυρίως στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και ριζών στους οποίους και δρα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ					
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ. σκευάσματος /στρ.	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Σιτάρι Κριθάρι	Πλατύφυλλα ζιζανία*	60-80 κ.ε. σκ. ανά στρ. ανάλογα με το είδος και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.	30-40	Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος του σταριού έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.	1 εφαρμογή
Αραβόσιτος	Πλατύφυλλα ζιζανία **	75 κ.ε. σκ.	30-40	Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή έως το στάδιο του πρώτου κόμβου και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-12 φύλλων.	1 εφαρμογή

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

***Σιτάρι, κριθάρι:** Κολλητσίδα, Παπαρούνα, Στελλάρια, Άγριο σινάπι, Καφέλλα, Χαμομήλι, Ανθεμίδα, Ραπανίδα, Αδωνης και Μπιφόρα.

****Αραβόσιτος:** Τα παραπάνω καθώς και τα Πλαγιαστό βλήτο, Τραχύ βλήτο, Αγριοβαμβακία, Λουβουδιά, Αγριοτοματιά, Αγριομελιτζάνα και Ασπράγκαθο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΡΗΙ(ΗΜΕΡΕΣ)
Σιτάρι	Δεν έχει εφαρμογή
Κριθάρι	Δεν έχει εφαρμογή
Αραβόσιτος	15 ημέρες

ΣΥΝΘΕΣΗ:

florasulam 0,625% β/ο
+ 2,4-D 2-EHE 45,25% β/ο
(30% β/ο 2,4-D ισοδύναμο οξύ)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

εναιώρημα σε γαλάκτωμα (SE)

ΠΡΟΣΟΧΗ



Το PINDAR[®] είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού.

Το penoxsulam είναι αναστολέας του ενζύμου ALS (acetolactate synthase), και δρα παρεμποδίζοντας την βιοσύνθεση αμινοξέων. Το triclopyr έχει δράση όμοια με αυτή των συνθετικών αυξινών, επηρεάζοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./100 λιτ. νερό	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Ρύζι	Ευαίσθητα ζιζάνια: Μουχρίτσες, Αμάνια, Μοσχοκύπερη, Ετερανθήρα, Βολ-βόσχοινο, Σκίρπος, Bidens frondosa	250	-	15-40*	Εφαρμογή στο ρύζι από τα 2 φύλλα έως το στάδιο δημιουργίας της ανθήλης ή στάδιο πράσινου δακτυλίου (Μάιος-Ιούνιος). BBCH 12-31	1
	Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Κίτρινη κύπερη				Ο χρόνος εφαρμογής εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της Μουχρίτσας και των λοιπών ζιζανίων**	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* Οι επιδόσεις του PINDAR δεν επηρεάζονται από τον όγκο του ψεκαστικού διαλύματος.

**

- Για τον «κόκκινο» βιότυπο Μουχρίτσας εφαρμογή από το 1ο φύλλο έως τα 1-2 αδελφία.
- Για τον «άσπρο» βιότυπο Μουχρίτσας εφαρμογή από το 1ο φύλλο έως τα 3-4 φύλλα και πάντα πριν την αρχή του αδελφώματος.
- Για την καταπολέμηση των Cyperaceae και άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων εφαρμογή από τα 1-2 φύλλα έως τα 4-5 φύλλα των ζιζανίων.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

penoxsulam 1,6% β/ο
triclopyr 12% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

ελαιώδες εναιώρημα (OD)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 70198 / 31.01.2017
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών. Το florasulam ανήκει στην ομάδα των triazolopyrimidine sulfonanilides που είναι αναστολείς του ενζύμου ALS (acetolactate synthase) που είναι απαραίτητο για την δημιουργία αμινοξέων στα ζιζάνια. Προκαλεί αναστολή της ανάπτυξης των ζιζανίων. Το clopyralid ανήκει στην ομάδα των pyridine-carboxylic acids. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες ενώ μεταφέρεται τόσο μέσω των ηθμωδών όσο και των ξυλωδών αγγείων. Συγκεντρώνεται δε στους μεριστωματικούς ιστούς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ./ στρ. (max)	κ.εκ./ 100 λιτ. νερό	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ: Σιτάρι (σκληρό και μαλακό), Τριτικάλε, Κριθάρι, Σίκαλη, Σπέλτα.	Πλατύφυλλα Ζιζάνια:*	15	-	10-40	Μεταφυτρωτική καθολική εφαρμογή από τα μέσα του αδελφώματος (5 αδέλφια) έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου.	1
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΣΙΤΗΡΑ: Σιτάρι (σκληρό και μαλακό), Κριθάρι, Βρώμη	Πλατύφυλλα Ζιζάνια:**	15	-	10-40	Μεταφυτρωτική καθολική εφαρμογή φυλλώματος από τα μέσα του αδελφώματος (5 αδέλφια) έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια:

Στελλάρια, Καψέλλα. Χαμομήλι, Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα.

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Παπαρούνα, Ραπανίδα, Άγριο Σινάπι.

** Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια:

Ραπανίδα, Άγριο Σινάπι, Αγριοτοματιά, Κενταύρια, Χαμομήλι, Περικοκλάδα ετήσια.

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Καψέλλα, Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα, Πολυκόμμι, Αγριοπιπεριά.

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

florasulam 2,5 % (β/ο)
clopyralid 30 % (β/ο)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ



Το PRINCIPAL® είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονουριών, για την καταπολέμηση αγρωστών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του καλαμποκιού. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται γρήγορα κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		γρ. / στρ.	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ	Αγρωστώδη Πολυετή αγρωστώδη Πλατύφυλλα ζιζάνια	9	-	20-40	Ο ψεκασμός γίνεται όταν το καλαμπόκι βρίσκεται στο στάδιο των 2-8 φύλλων (BBCH 11-18)	1
	Αγρωστώδη Πολυετή αγρωστώδη Πλατύφυλλα ζιζάνια	4,5	-	20-40	Ο ψεκασμός γίνεται όταν το καλαμπόκι βρίσκεται στο στάδιο των 2-8 φύλλων (BBCH 11-18)	2 ανά 7 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σε πολυετή αγρωστώδη, το PRINCIPAL® πρέπει να εφαρμόζεται σε δοσολογία 9 g/στρ μαζί με Trend® 90.

Να μην χρησιμοποιείται σε γλυκό καλαμπόκι.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια

Πολύ ευαίσθητα αγρωστώδη: Πάνικο διχοτομικό, Πάνικο το κεχροειδές, Άγρια βρώμη, Μουχρίτσα, Κοινή πόα, Ήρα πολυετής, Σετάρια γλαυκόχρους, Σετάρια πράσινη, Σετάρια σπονδυλωτή, Αλεπονουρά.

Ευαίσθητα αγρωστώδη: Αιματόχορτο, Άγρωστη η σπονδυλωτή, Βέλιουρας (ρίζωμα), Αγριάδα.

Πολύ ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Βλήτο καλλιεργούμενο, Καφελλα, Χηνοπόδιο το πολύσπερμο, Αγριοραπανάδα, Αναβλάστηση ελαιοκράμβης, Αγριοσινάπι, Μαρτιάκος, Στελλάρια.

Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Λουβουδιά, Ζωχός, Χαμομήλι, Σκαρολάχανο, Στύφνος, Λαπάτσα, Άγρια Σίκαλη, Αγριοπιπεριά, Αναβλάστηση ηλιάνθου, Πολυκόμπι, Λάπαθο.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

nicosulfuron 42,9% β/β
rimsulfuron 10,7% β/β

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 70230/ 28.07.2017
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: NTY PONT ELLAS A.E.

Το RUSH® WG είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση του βέλιουρα και άλλων αγρωστών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλαμπόκι, τομάτα και πατάτα. Δρά διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων. Στο έδαφος διασπάται πολύ γρήγορα και ως εκ τούτου δεν έχει υπολειμματική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		γρ./στρ.	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Καλαμπόκι	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	5-6 με προσθήκη επιφανειοδραστικού Trend 90 σε αναλογία 0,1% κατ' όγκο	20-40	Στον αραβόσιτο μεταφυτρωτικά από τα 2 έως τα 8 πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα.	2
Πατάτα	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	5-6 με προσθήκη επιφανειοδραστικού Trend 90 σε αναλογία 0,1% κατ' όγκο	20-40	Προφυτρωτική εφαρμογή και μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν η πατάτα να έχει ύψος 10-20 εκ.	2
Τομάτα από σπόρο ή μεταφυτευόμενη	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	5-6 με προσθήκη επιφανειοδραστικού Trend 90 σε αναλογία 0,1% κατ' όγκο	20-40	Όταν η τομάτα από σπόρο έχει 2-3 πραγματικά φύλλα ή όταν τα φυτά της μεταφυτευόμενης τομάτας ξεπεράσουν το σοκ της μεταφύτευσης	2-3

Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:

Βρώμη, Μουχρίτσα, Πάνικο, Κεχρί, Φαλαρίς, Σετάρια, Βέλιουρας δίχρωμος, Βέλιουρας από σπόρο ή ρίζωμα.

Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:

Αγριομπαμπακιά, Τραχύ Βλήτο, Αμβροσία, Ασπροκέφαλος, Ψαλίδες, Καφέλλα, Περιπλοκάδι, Άγρια ρόκα, Καπνόχορτο, Καλινσόγκα, Κολοκάσι, Χαμομήλι, Μέντα η μικρόφυλλη, Οροβάγχη, Πικρίς, Νεραντζούλα, Ράπιστρο, Άγριο σινάπι, Ζωχός, Αγριομελιτζάνα.

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Πλαγιαστό βλήτο, Τάτουλας, Αιματόχορτο, Αγριοντοματιά - στάδιο κοτυληδόνων.

Ανθεκτικά ζιζάνια:

Λουβουδιά, Κίρσιο, Περικοκλάδα, Κύπερη, Πολυκόμμι, Λαπάτσα, Αγριοντοματιά – μετά τα 2 φύλλα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Καλαμπόκι	80
Πατάτα	30
Τομάτα	30

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

rimsulfuron 25% (β/β)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 70170/09.08.2016
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Το florasulam είναι αναστολέας του ενζύμου ALS (acetolactate synthase). Προκαλεί αναστολή της ανάπτυξης των ζιζανίων. Το Penoxsulam ανήκει στην χημική ομάδα των sulphonamides triazolopyrimidines. Αναστέλει και αυτό το ένζυμο ALS. Το penoxsulam απορροφάται από το φύλλωμα και το ριζικό σύστημα των ευαίσθητων ειδών. Η μετακίνησή του και κατά συνέπεια και η αποτελεσματικότητά του αυξάνονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε φάση ενεργής ανάπτυξης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ./ 100 λιτ. νερό	κ.εκ./ στρ. (max)	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια Μανταρίνια Λεμόνια)	Πλατύφυλλα ζιζάνια	-	8-10	25-30	Κατευθυνόμενη προφυτρωτική εφαρμογή στις σειρές φύτευσης, αποφεύγοντας να ψεκάζονται φύλλα, βλαστοί, παραφυάδες και σημεία κλαδέματος την Άνοιξη.	1
Ελιά	Πλατύφυλλα ζιζάνια	-	8-10	20-30	Κατευθυνόμενη προφυτρωτική εφαρμογή στις σειρές φύτευσης, αποφεύγοντας να ψεκάζονται φύλλα, βλαστοί, παραφυάδες και σημεία κλαδέματος την άνοιξη ή το φθινόπωρο.	1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Λουβουδιά, Βλήτο τραχύ, Βλήτο πλαγιαστό, Ζωχός, Αγριοτομάτα, Στύφνος, *Diplotaxis virgata*, Δωδεκάνθι, Στελλάρια, Ζωχός πολυετής, Κόνυζα, Λαψάνα, Καλέντουλα, Αντράκλα.

Εφαρμόζεται μόνο σε εγκατεστημένες φυτείες από τον τρίτο χρόνο μετά την φύτευσή τους και αργότερα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του φυτού.

Οι εφαρμογές στην ελιά να γίνονται άνοιξη ή φθινόπωρο.

Οι εφαρμογές στα εσπεριδοειδή να γίνονται την άνοιξη.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	(ΡΗΙ) ΗΜΕΡΕΣ
Ελιά	15
Εσπεριδοειδή	30

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

florasulam 7.5 % (β/ο)
penoxsulam 15 % (β/ο)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

συμπυκνωμένο
εναιώρημα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ



Το VIPER™ MAX είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μόνο κατά ένα μέρος από τις ρίζες του ζιζανίου. Τα πρώτα αποτελέσματα κατά της εισβολής εμφανίζονται 5-10 μέρες μετά την εφαρμογή και το τελικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται έπειτα από 3-4 εβδομάδες.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		λίτρα/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Ρύζι	Μουχρίτσα, Λεπτοχλόα	0,3	-	20-30	Το VIPER MAX μπορεί να εφαρμοστεί στο ρύζι από τα 3 φύλλα, έως τα 3 αδέρφια. Χρόνος εφαρμογής από 2 φύλλα έως και 4 φύλλα των ζιζανίων (BBCH 12 – 31).	1

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:
 penoxsulam 1,33% β/ο
 cyhalofop-butyl 10% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
 ελαιώδες εναιώρημα (OD)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 70127/29.7.2015
 ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Το VIPER™ είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού.

Το penoxsulam είναι αναστολέας του ενζύμου ALS (acetolactate synthase), και δρα παρεμποδίζοντας την βιοσύνθεση αμινοξέων. Το προϊόν απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και εν μέρη από τις ρίζες των ζιζανίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ/ 100 λίτ. νερό	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Ρύζι	Ευαίσθητα ζιζάνια: Μουχρίτσες, Πεντάνευρο νερού, Αμάνια, Μοσχοκύπερη, Σκίρπος, Bidens tripartita	200	-	15-40	Εφαρμογή στο ρύζι από τα 2 φύλλα έως το στάδιο δημιουργίας της ανθήλης ή στάδιο πράσινου δακτυλίου (Μάιος-Ιούνιος). BBCH 12-31	1
	Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Βουτόμο, Αγριοπιπεριά, Βολβόσχοινο, Cyperus serotinus				Ο χρόνος εφαρμογής εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της Μουχρίτσας και των λοιπών ζιζανίων.	

Για τον «κόκκινο» βιότυπο Μουχρίτσας εφαρμογή από το 1^ο φύλλο έως τα 1-2 αδέλφια.

Για τον «άσπρο» βιότυπο Μουχρίτσας εφαρμογή από το 1^ο φύλλο έως τα 3-4 φύλλα και πάντα πριν την αρχή του αδελφώματος.

Για την καταπολέμηση των Cyperaceae, Alismataceae και άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων εφαρμογή από τα 1-2 φύλλα έως τα 3-4 φύλλα των ζιζανίων.

ΣΥΝΘΕΣΗ:
penoxsulam 2,04% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
ελαιώδες εναιώρημα (OD)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 70218/13.07.2017
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ **ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ**

Delegate™ 250 WG	29	Laser™ 480SC	34
Eskif™ 120 SC	30	Onore™ 240SC	36
Flash™ 120SC.....	31	Success™ 0,24CB	37
Jerdez™ 500WG	33		

Το DELEGATE™ 250 WG είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Ανήκει στην ομάδα των spinosyns (κατάταξη IRAQ/ Gr. 5). Δρα στοχεύοντας σε ένα συγκεκριμένο σημείο του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης. Το DELEGATE™ 250 WG έχει διελασματική κίνηση στους φυτικούς ιστούς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ					
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		γρ/ στρ. (max)	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Μηλοειδή (Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά)	Καρπόκαψα, Φυλλοδέτερες, Φυλλορύκτες	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-87	1
Μηλοειδή (αχλαδιά)	Ψύλλα	40	100-120	Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2ης και 3ης γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-87	1
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερυκοκιά)	Φυλλοδέτερες, Βλαστορύκτες, Καρπόκαψα	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-89	1
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά Βερυκοκιά)	Θρίπας	35	100-120	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-89	1
Πυρηνόκαρπα (Δαμασκηλιά)	Φυλλοδέτερες, Ανάρσια, Καρπόκαψα	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-89	1
Ελιά	Πυρηνοτρήτης	10	100-150	Εφαρμογή στο πρώτο στάδιο εκκόλαψης αυγών της καρποφάγου γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 69-73	2/ 28
Φιστικιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Ψύλλα Φιστικιάς, Σκώρος Φιστικιάς	40	100-200	Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2ης και 3ης γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Κερασιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Μύγα των φρούτων	30	80-150	Με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-87	2/ 28
Βυssινιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Μύγα των φρούτων	30	80-150	Με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-87	2/ 28
Αμυγδαλιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Καρπόκαψα, Ανάρσια	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις	1
Καρυδιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Ανάρσια, Καρπόκαψα	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Φουντουκιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Καρπόκαψα	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Καστανιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Φυλλοδέτερες, Καρπόκαψα	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΗΜΕΡΕΣ
Μηλοειδή: (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά)	7
Πυρηνόκαρπα: (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηλιά)	7

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΗΜΕΡΕΣ
Ελιά	21
Κερασιά, Βυssινιά	3
Φιστικιά Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Καστανιά	14

ΣΥΣΤΑΣΗ:
 spinetoram: 25% (β/β)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
 εναιωρηματοποιησιμοί κόκκοι (WG)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 14601/20.2.2017
 ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Το ESKIF™ 120 SC είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Ανήκει στην ομάδα των spinosyns (κατάταξη IRAQ/ Gr. 5). Δρα στοχεύοντας σε ένα συγκεκριμένο σημείο του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης. Το ESKIF™ 120 SC έχει διελασματική κίνηση στους φυτικούς ιστούς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ					
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ./ στρέμμα	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Αμπέλι (Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο, Σταφίδα)	Ευδεμίδα, Μύγα Μεσογείου	20-30	40-100	Εφαρμογή είτε στο μέγιστο των πτήσεων ή στην έναρξη των πτήσεων στη 2η και 3η γενεά και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 28 ημέρες και σύμφωνα με το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων. (Στάδιο σχηματισμού σταφυλής μέχρι πλήρη ωρίμανση: BBCH 71-89)	2
	Θρίπας	20-30	40-100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 28 μέρες ανάλογα με το επίπεδο της προσβολής και γεωργικές προειδοποιήσεις. Συνίσταται το ψεκαστικό υγρό να καλύπτει το φύλλωμα και κυρίως τα σταφύλια. (Στάδιο σχηματισμού σταφυλής μέχρι πλήρη ωρίμανση: BBCH 71-89)	
Βαμβάκι	Πράσινο σκουλήκι	50	50	Εφαρμογές με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών. Οι εφαρμογές γίνονται με την εμφάνιση των ανθικών οργάνων και μέχρι το άνοιγμα 20% των καρυδιών. (BBCH 51-72)	1

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Αμπέλι (Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο, Σταφίδα)	7
Βαμβάκι	21

ΣΥΣΤΑΣΗ:
spinetoram: 12 % β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
πυκνό εναιώρημα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 14698/22.04.2019
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Το FLASH™ 120 SC (τεχνολογία ISOCLAST™ ACTIVE) είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο με κίνηση μέσω των ξυλωδών αγγείων και με διελασματοκή κίνηση εντός των φυτικών ιστών. Στα έντομα δρα κυρίως δια της επαφής και δια της κατάποσης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ					
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	Δόσεις σκ. κ.εκ. / στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (L/στρ)	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά, Αχλαδιά, Nashi, Κυδωνιά, Μουσμουλιά	Αφίδες Aphis pomi, Dysaphis plantaginea, Aphis gossypii, Aphis spiraeicola	20	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (20 κ.εκ./στρ.) και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40 κ.εκ./ στρ.). Προ-ανθικά: από το φούσκωμα των οφθαλμών έως πριν την άνθηση (BBCH 51-59). Μετά την άνθηση: από το τέλος της άνθησης έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 69-85).	1-2
	Eriosoma lanigerum	40		Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (40 κ.εκ./στρ.). Προ-ανθικά: από το φούσκωμα των οφθαλμών έως πριν την άνθηση (BBCH 51-59). Μετά την άνθηση: από το τέλος της άνθησης έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 69-85).	1
	Κοκκοειδή, Ψώρα Σαν Ζοζέ , Quadraspidotus perniciosus	40		Εφαρμογή στο στάδιο των κινητών/ ερπουσών μορφών (όταν έχουν εκκολαφθεί τα περισσότερα αυγά) Προ-ανθικά, από το φούσκωμα των οφθαλμών έως πριν την άνθηση (BBCH 51-59). Μετά την άνθηση: από το τέλος της άνθησης έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 69-85).	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά, Κερασιά	Αφίδες Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Aphis spiraeicola	20	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40 κ.εκ./ στρ.)	1-2
	Myzus persicae, Myzus cerasi	30	30-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Προ-ανθικά: από το φούσκωμα των οφθαλμών έως πριν την άνθηση (BBCH 51-59). Μετά την άνθηση: από το τέλος της άνθησης έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 69-85).	1
	Κοκκοειδή, Ψώρα Σαν Ζοζέ Quadraspidotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona	40	30-150	Εφαρμογή στο στάδιο των κινητών/ ερπουσών μορφών (όταν έχουν εκκολαφθεί τα περισσότερα αυγά). Προ-ανθικά: από το φούσκωμα των οφθαλμών έως πριν την άνθηση (BBCH 51-59). Μετά την άνθηση: από το τέλος της άνθησης έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 69-85).	1
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ	Αφίδες Aphis spiraeicola, Aphis gossypii, Aphis citricidus, Toxoptera aurantii	20	100-250	Εφαρμογή (με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Προ-ανθικά: από την αρχή ανάπτυξης των βλαστών έως πριν την άνθηση (BBCH 30-59). Μετά την άνθηση: από το τέλος της άνθησης έως τη συμπλήρωση ωρίμανσης του χρώματος (BBCH 69-85).	1-2
	Κοκκοειδή Aonidiella aurantii	20		Εφαρμογή στο στάδιο των κινητών/ έρπουσων μορφών (όταν έχουν εκκολαφθεί τα περισσότερα αυγά) ή δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Προ-ανθικά: από την αρχή ανάπτυξης των βλαστών έως πριν την άνθηση (BBCH 30-59). Μετά την άνθηση: από το τέλος της άνθησης έως τη συμπλήρωση ωρίμανσης του χρώματος (BBCH 69-85).	1-2
	Ψευδόκκοκος Planococcus citri	40		Εφαρμογή στο στάδιο των κινητών/ έρπουσων μορφών (όταν έχουν εκκολαφθεί τα περισσότερα αυγά) ή δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Προ-ανθικά: από την αρχή ανάπτυξης των βλαστών έως πριν την άνθηση (BBCH 30-59). Μετά την άνθηση: από το τέλος της άνθησης έως τη συμπλήρωση ωρίμανσης του χρώματος (BBCH 69-85).	1
ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τομάτα, Πιπεριά, Πιπεριά chili, Μελιτζάνα (ΥΠΑΙΘΡΟΥ/ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ)	Αφίδες Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae	20	50-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. Επανάληψη αν χρειάζεται 7 ημέρες μετά.	1-2
		20	50-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες.	1-2
	Αλευρώδεις Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci	40		Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40 κ.εκ./ στρ.) Εφαρμογές Υπαίθρου: Προ-ανθικά: από το στάδιο του 1ου σταυρού έως πριν την άνθηση (BBCH 20-59). Μετά την άνθηση: από το τέλος της άνθησης έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 69-87). Εφαρμογές Θερμοκηπίου: από το στάδιο του 1ου σταυρού έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού (BBCH 20-87)	1

(συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό. Αγγούρια, Αγγου- ράκια gherkins, Κολοκυθάκια, Κολοκύθες, Καρ- πούζια, Πεπόνια (ΥΠΑΙΘΡΟΥ/ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ)	Αφίδες Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis nasturtii, Aphis fabae	20	50-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. Επανάληψη αν χρειάζεται 7 ημέρες μετά. Εφαρμογές Υπαίθρου Προ-άνθηκα: από το στάδιο του 1ου σταυρού έως πριν την άνθηση (BBCH 20-59). Μετά την άνθηση: από το τέλος της άνθησης έως το 70% της ωρίμανσης των καρπών. BBCH 69-87. Εφαρμογές Θερμοκηπίου: BBCH: 20-87	1-2
	Αλευρώδεις Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci	20 40	50-150	Εφαρμογή (20 κ.εκ./στρ.) με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40 κ.εκ./ στρ.). Εφαρμογές Υπαίθρου: Προ-άνθηκα: από το στάδιο του 1ου σταυρού έως πριν την άνθηση (BBCH 20-59). Μετά την άνθηση: από το τέλος της άνθησης έως το 70% της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 69-87). Εφαρμογές Θερμοκηπίου: από το στάδιο του 1ου σταυρού έως το 70% της ωρίμανσης των καρπών (BBCH: 20- 87).	1-2 1
ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μαρούλι, Σπανάκι (ΥΠΑΙΘΡΟΥ)	Αφίδες Nasonovia ribisnigri, Myzus persicae	20	20-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. Από το στάδιο των 10 φύλλων έως το σχηματισμό της κεφαλής (BBCH 20-49).	1
ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο Βρυξελλών, Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο λάχανο (ΥΠΑΙΘΡΟΥ)	Αφίδες Brevicoryne brassicae, Myzus persicae	20	20-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. Από το στάδιο των 10 φύλλων έως το σχηματισμό της κεφαλής (BBCH 20-49).	1
ΒΟΛΒΩΔΗ, ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ/ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ)	Αφίδες Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum rosae, Aphis gossypii, Phyllaphis fagi	20	20-120	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων (20 κ.εκ./στρ.) και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Από την αρχή της βλάστησης και έως πριν την άνθηση (BBCH 12-59).	1-2
	Αλευρώδεις Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci	20 40		Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (20 κ.εκ./στρ.) και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40 κ.εκ./ στρ.) Από την αρχή της βλάστησης και έως πριν την άνθηση (BBCH 12-59).	1-2 1

**ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (BBCH 60-69)**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. **Η μέγιστη δόση/ στρέμμα/ καλ. περίοδο είναι: 40 κ.εκ.,**
για τα μπλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, σολανώδη,
κολοκυνθοειδή, βολβώδη, καλλωπιστικά φυτά και λουλού-
δια, καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι.
Η μέγιστη δόση/ στρέμμα/ καλ. περίοδο είναι: 20 κ.εκ.,
για τα φυλλώδη λαχανικά (Μαρούλι, σπανάκι) και τα σταυ-
ρανθή (brassicas).
2. Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχόπτωση μέσα στην επό-
μενη 1 ώρα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Φυλλώδη λαχανικά, Σταυρανθή	7
Σολανώδη, Κολοκυνθοειδή, Βολβώδη, Καλλωπιστικά	1

ΣΥΣΤΑΣΗ:
sulfoxaflor (isoclast™ active)
12% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
πυκνό εναιώρημα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 14730/20.12.2019
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Το JERDEZ™ 500 WG (τεχνολογία ISOCLAST™ ACTIVE) είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο με κίνηση μέσω των ξυλωδών αγγείων και με διελασματική κίνηση εντός των φυτικών ιστών. Στα έντομα δρα κυρίως δια της επαφής και δια της κατάποσης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
		γραμ. σκευάσμ. /100 λιτρ.	γραμ. σκευάσμ./ στρέμμα	όγκος ψεκαστικού υγρού (L/στρ)		
Βαμβάκι	Αφίδες, Λύγκος	–	4.8	30-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων αποικιών των εντόμων. Στάδιο: Από την ανάπτυξη των πλευρικών βλαστών ως το άνοιγμα του 70% των καρυδιών. (BBCH 20 – 87)	2/7

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
ΒΑΜΒΑΚΙ	14

ΣΥΣΤΑΣΗ:
sulfoxaflor (isoclast™ active) 50 % β/β

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 14696/17.04.2019
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Το LASER™ 480SC είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση εντόμων των τάξεων Lepidoptera, Diptera Siphonaptera, Thysanoptera, και κάποια Coleoptera σε διάφορες καλλιέργειες. Το spinosad δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΕΧΘΡΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά, Αχλαδιά	Καρπόκαψα των μήλων, Νάρκη των γιγαρτοκάρπων	20-30	100-125	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες	3
Αχλαδιά**	Ψύλλα της αχλαδιάς	30-35	100-125		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά, Βερυκοκιά	Βλαστορύκτης της ροδακινιάς	20	100	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες	3
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά	Drosophila suzukii	20	100	Ψεκάσμοι φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες	2
Αμπέλι	Ευδεμίδα	10-15	40-120	Η εφαρμογή, στην 2η και στην 3η γενιά, μπορεί να γίνει είτε στο μέγιστο των πτήσεων ή στην έναρξη των πτήσεων του εντόμου και επαναλαμβάνεται μετά 7-10 ημέρες και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις	4
	Θρίπας της Καλιφόρνιας	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται στην έναρξη (10-20%) της ανθοφορίας και όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά τσαμπί και επαναλαμβάνεται μετά 7-10 ημέρες	
Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Drosophila suzukii	20	40-80	Ψεκάσμοι φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες	3
Τομάτα (Υ)***	Φυλλορύκτης	50	50-60	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες	3
	Tuta absoluta	20-25	50-100		
Τομάτα (Θ)***	Φυλλορύκτης	50-75	50-150	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών)/ άνθος και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10ημέρες	
	Θρίπας της Καλιφόρνιας	20-25	50-150		
Τομάτα (Θ/Υ)	Spodoptera sp.	25-30	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες	2 εφαρμογές, με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
	Tuta absoluta	20-25	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών προσβολής	
Πιπεριά (Υ)	Φυλλορύκτης	50	50-60	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες	3
Πιπεριά (Θ)	Φυλλορύκτης	50-75	50-100		
	Θρίπας της Καλιφόρνιας	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών)/ άνθος και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10ημέρες	
Αγγούρι (Θ)	Θρίπας της Καλιφόρνιας	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών)/ άνθος και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10ημέρες	3
Μελιτζάνα (Θ)	Θρίπας της Καλιφόρνιας	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών) / άνθος και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10ημέρες	3
Φράουλα (Θ)	Θρίπας της Καλιφόρνιας	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά άνθος και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες	3

Φράουλα (Θ)	Drosophila suzukii	20	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες	3
Βαμβάκι	Πράσινο σκουλήκι	15-20 (κ.εκ/ στρ)	50-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες	3
Πατάτα	Δορυφόρος	5	100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες	3
Φιστικιά	Ψύλλα της φιστικιάς	30	100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση ωών και νυμφών στα φύλλα. Μεσοδιαστήματα 14-21 ημέρες. Έως 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο	3
Σπανάκι	Θρίπας Θρίπας της Καλιφόρνιας	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων ενηλίκων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες	3
Ρόκα	Θρίπας της Καλιφόρνιας	20-25	40-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών	3
Σαλάτα (θερμοκη- πίου γαλλική)	Θρίπας της Καλιφόρνιας	20-25	40-80	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών	3
Φοινικοειδή	Paysandisia archon	75	40-100	Εφαρμογή στο μέγιστο των πτήσεων του εντόμου και πριν την εγκα- τάσταση της προσβολής. Επανάληψη μετά από 15 ημέρες εφ' όσον συνεχίζονται συλλήψεις του εντόμου. Ο ψεκασμός πρέπει να κατευθύνεται στη στεφάνη / κορυφαίο τμήμα του κορμού (0,50 έως 1 μέτρο από την κορυφαία περιοχή), που είναι η προτιμώμενη περιοχή αναπαραγωγής του θηλυκού και όχι σε ολόκληρο το δένδρο	2
Μικροί καρποί (Θ), Βατόμουρο, Σμέ- ουρο, Μύρτιλλο	Drosophila suzukii	20	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες	2
Μαρούλι (Υ/Θ)	Προνύμφες Λεπιδό- πτερων Heliothis Armigera	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες	2
Αντίδι (Υ/Θ)	Προνύμφες Λεπιδόπτερων Heliothis Armigera, Spodoptera sp.	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες	3
Παντζάρι (Φύλλωμα) (Υ/Θ)	Προνύμφες Λεπι- δόπτερων Heliothis Armigera, Spodoptera sp.	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες	3

** Συνιστάται συνδυασμός με παραφινικό λάδι στη δόση 250 κ.εκ./hl στην αχλαδιά για αντιμετώπιση της ψύλλας Psylla pyri, για αύξηση της αποτελεσματικότητας.

*** Στην τομάτα, αγρού και θερμοκηπίου, για την αντιμετώπιση του φυλλορύκτη, το LASER 480 SC μπορεί να εφαρμοστεί στη δόση 35-50 κ.εκ./ σκευάσματος/hl σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι στη δόση 300 κ.εκ./hl.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηινιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Πατάτα, Σμέουρο, Βατόμουρο, Μύρτιλλο, Φιστικιά	7
Αχλαδιά (εφαρμογές για καταπολέμηση της Ψύλλας), Αμπέλι	14
Φράουλα	1
Τομάτα, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σπανάκι, Ρόκα, Σαλάτα θερμοκηπίου, Μαρούλι, Αντίδι, Παντζάρι (Φύλλωμα)	3
Βαμβάκι	21
Φοινικοειδή	-

ΣΥΣΤΑΣΗ:
spinosad: 48% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
πυκνό εναιώρημα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΕΚ): 14025/13.5.2008
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Το ONORE™ 240 SC είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των διακυλυδραζινών. Το methoxyfenozide είναι ρυθμιστής της ανάπτυξης των εντόμων και δρά ως μιμητικό της ορμόνης έκδυσης της εκδυσόνης, στις προνύμφες των λεπιδοπτέρων. Λόγω της δέσμευσης του methoxyfenozide στη θέση-δέκτη της εκδυσόνης, προκαλείται πρόωμη και ατελής έκδυση, με αποτέλεσμα το θάνατο του εντόμου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά/ Μανταρινιά)	Φυλλοκνίστης	80	40	200	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, στοχεύοντας στους νέο-εκπυσσόμενους βλαστούς. Μίγμα με θερινό πολτό σε δόση 300-500ml/hl. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες.	2
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	Καρπόκαψα, Φυλλοδέτης, Φυλλορύκτες	72	40	100-180	Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 -21 ημέρες.	3
Πυρηνόκαρπα, (Ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά)	Φυλλοδέτης	72	40	150-180	Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 -21 ημέρες.	3
Αμπέλι, (Ποικιλίες επιτραπέζιες, οινοποιήσιμες, και σταφίδες)	Ευδεμίδα	50	40	100-125	Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες.	4
Τομάτα, Πιπεριά (Θερμοκηπίου)	Σποντόπτερα	60	40	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση τη προσβολής. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 -21 ημέρες.	3

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΡΗΙ(Η & ΡΕΣ)
Μηλιά, Αχλαδιά	14
Πορτοκαλιά / Μανταρινιά	14
Βερικοκιά, Ροδακινιά (συμπεριλαμβανομένης της νεκταρινιάς)	7
Τομάτα	1
Πιπεριά	1
Οινοποιήσιμα/ Επιτραπέζια/ Σταφίδα	14/7/7

ΣΥΣΤΑΣΗ:

methoxyfenozide: 24% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

συμπυκνωμένο
εναιώρημα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΕΚ): 14357/1.3.2011
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Το Success™ 0.24 CB είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ					
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		κ.εκ./ στρέμμα	λίτρα/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.	
Ελιά	Δάκος	100	3,33	3 Εφαρμογή 300 κ.εκ./ανά ψεκαζόμενο δένδρο, σε 10 δένδρα/στρέμα	Δολωματικός ψεκασμός από εδάφους. (με συλλογική κατοπολέμηση) Από την έναρξη της πύξης του πυρήνα του ελαιόκαρπου και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.
			6,66	1,5 Εφαρμογή 300 κ.εκ./ανά ψεκαζόμενο δένδρο σε 5 δένδρα/στρέμα	

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΡΗΙ (ΗΜΕΡΕΣ)
Ελιά	14 ημέρες

ΣΥΣΤΑΣΗ:
spinosad 0.024 % β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
συμπυκνωμένο δόλωμα (CB)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΕΚ): 1986/24.8.2009
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΑ



TM ® TRADEMARKS OF DOW AGROSCIENCES, DUPONT OR PIONEER, AND THEIR AFFILIATED COMPANIES OR THEIR RESPECTIVE OWNERS. © 2020 CORTEVA.

Vydate®
10SL

Φυτοπροστατευτικά
Νηματωδοκτόνο

Διασυστηματικό καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο με διπλή δράση (επαφής και στομάχου). Δρα στο νευρικό σύστημα λόγω αναστολής της ακετυλοχολινεστεράσης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
		λίτρα (L)/ στρ.	ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ	
Τομάτα, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου και υπαίθρου)*	Νηματώδεις Meloidogyne sp.	1-2 1	Στη μεταφύτευση. Ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση) με τελευταία εφαρμογή έως 42 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.	1 1-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Πιπεριά (Θερμοκηπίου και υπαίθρου)*	Νηματώδεις Meloidogyne sp.	1-2 1	Στη μεταφύτευση. Ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση) με τελευταία εφαρμογή έως 28 ημέρες μετά τη μεταφύτευση	1 1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αγγούρι (Θερμοκηπίου και υπαίθρου)*	Νηματώδεις Meloidogyne sp.	1-2 1	Στη μεταφύτευση. Ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση)	1 1
Πεπόνι Καρπούζι (Θερμοκηπίου και υπαίθρου)*	Νηματώδεις Meloidogyne sp.	1-2 1	Στη μεταφύτευση. Ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση)	1 1
Μπανάνα (αγρού)	Νηματώδεις Meloidogyne spp. Pratylenchus spp.	1	Έως το 50% των τσαμπιών να φτάσει το μέγιστο πάχος των φρούτων.	1-3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι ανωτέρω εφαρμογές για την αντιμετώπιση των νηματωδών έχουν δευτερεύουσα δράση και σε αλευρώδεις/αφίδες.

*Με την προϋπόθεση εδαφοκάλυψης με αδιαφανές πλαστικό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΗΜΕΡΕΣ
Τομάτα, Μελιτζάνα	28
Πιπεριά	35
Αγγούρι	50
Μπανάνα	7
Πεπόνι - Καρπούζι	50

ΣΥΣΤΑΣΗ:
oxamyl 10% (β/ο)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
υδατοδιαλυτό υγρό (SL)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΕΚ): 3.054/4.10.2013
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Διασυστηματικό καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο με διπλή δράση (επαφής και στομάχου). Δρα στο νευρικό σύστημα λόγω αναστολής της ακετυλοχολινεστεράσης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ				
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ
		κιλά/στρ.		
Πατάτα Πρώιμη Πατάτα	Νηματώδεις Heterodera sp. Globotera sp.	4-5,5	Σκόρπισμα σ' ολόκληρη την επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 10 εκ.	1
Καπνός	Νηματώδεις Meloïdogyne sp. Meloïdogyne incognita	4,25-5,5 3	Σκόρπισμα σ' ολόκληρη την επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 10 εκ. Εφαρμογή σε λωρίδες ή στο αυλάκι	1
Καρότο	Νηματώδεις Meloïdogyne sp.	2,5	Εφαρμογή σε λωρίδες ή στο αυλάκι κατά τη μεταφύτευση	1
Μελιτζάνα, Τομάτα (Θερμοκηπίου και υπαίθρου με την προϋπόθεση εδαφοκάλυψης με αδιαφανές πλαστικό)	Νηματώδεις Meloïdogyne sp.	4,5-5,5 3	Σκόρπισμα σ' ολόκληρη την επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 10 εκ. Εφαρμογή σε λωρίδες ή στο αυλάκι	1

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Πρώιμη Πατάτα	84
Καρότο	75
Λοιπές καλλιέργειες	Μη εφαρμόσιμο

ΣΥΣΤΑΣΗ:
 oxamyl 10% (β/β)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
 GR - κοκκώδης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

Alper® Plus 4,5/68WG	41	Sirocco® M44 WP	47
Curzate® 60WG.....	42	Staba™ 5 EW.....	48
Equation® CORE WG*	43	Systhane™ ULTRA 45EW.....	49
Fontelis® 20SC.....	44	Talendo® 20EC.....	50
Karathane™ R*	46		

* ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

™ ® TRADEMARKS OF DOW AGROSCIENCES, DUPONT OR PIONEER,
AND THEIR AFFILIATED COMPANIES OR THEIR RESPECTIVE OWNERS. © 2020 CORTEVA.

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) και ενός επαφής (mancozeb) με προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ)
		γραμ. σκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα / στρέμμα)	γραμ. σκευάσ./ στρέμμα		
Πατάτα	Περωνόσπορος	200-250	100	200-250	Προληπτικές εφαρμογές, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, που αρχίζουν συνήθως όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.	4 / 7-14

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Πατάτα	21

ΣΥΣΤΑΣΗ:

cymoxanil: 4,5 % β/β
mancozeb: 68 % β/β

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΕΚ): 60054/19.05.2006
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με θεραπευτική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ					
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΥΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Τομάτα υπαίθρου και θερμοκηπίου	Περονόσπορος	20-30	50-130	Από την μεταφύτευση έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15-89). Αν ο όγκος του ψεκ. διαλύματος είναι μικρότερος από 100 L/στρ., ψεκάστε με min 20γρ/στρ.	4 ανά 7 ημέρες
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (αγγούρι, αγγουράκι, κολοκυθάκι) υπαίθρου και θερμοκηπίου	Περονόσπορος	20-30	50-130	Από την μεταφύτευση έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15-89). Αν ο όγκος του ψεκ. διαλύματος είναι μεγαλύτερος από 100 L/στρ, ψεκάστε με max 40γρ/στρ. Αν ο όγκος του ψεκ. διαλύματος είναι μικρότερος από 100 L/στρ., ψεκάστε με min 20γρ/στρ.	4 ανά 7 ημέρες
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό (Πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθα) υπαίθρου και θερμοκηπίου	Περονόσπορος	40	50-100	Από την μεταφύτευση έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15-89). Αν ο όγκος του ψεκ. διαλύματος είναι μεγαλύτερος από 100 L/στρ, ψεκάστε με max 40γρ/στρ. Αν ο όγκος του ψεκ. διαλύματος είναι μικρότερος από 100 L/στρ., ψεκάστε με min 20γρ/στρ.	4 ανά 7 ημέρες
Μαρούλι υπαίθρου	Περονόσπορος	20-40	50-100	Από τα 9 φύλλα έως την πλήρη ανάπτυξη του φυλλώματος (BBCH 19-49)	4 ανά 7 ημέρες
Κρεμμύδια και σκόρδο, πράσο με extrapolation υπαίθρου	Περονόσπορος	30-40	30-100	Από τα 5 φύλλα μέχρι το 50% των φύλλων να γείρει. (BBCH 15-48)	4 ανά 7 ημέρες
Πατάτα	Περονόσπορος	15-20	30-100	Από τα 5 φύλλα μέχρι το κιτρίνισμα των φύλλων (BBCH 15-93)	5 ανά 7 ημέρες

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Τομάτα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι	3
Μαρούλι, Πατάτα Κρεμμύδια, Σκόρδο, Πράσο	7

ΣΥΣΤΑΣΗ:
cymoxanil 60% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
εναιωρηματοποιήσιμοι
κόκκοι (WG)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 60478/02.10.2015
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: NTY PONT ELLAS A.E.

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική και θεραπευτική δράση. Δρα δι επαφής στα βλαστώντα σπόρια των μυκήτων και έχει ενδοθεραπευτική δράση στο μυκήλιο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των μυκήτων. Η προληπτική δράση του σκευάσματος οφείλεται στο famoxadone, ενώ η θεραπευτική, διελασματική και τοπικά διασυστηματική δράση, στο cymoxanil.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		γρ/ στρ.	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι	Περωνόσπορος	40	-	20-150	Από το 5ο φύλλο μέχρι την έναρξη αλλαγής χρώματος. BBCH 15-83	3 με ελαχ. μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Τομάτα υπαίθρου	Περωνόσπορος Αλτερνάρια	40	-	20-100	Από το 5ο φύλλο ως την συγκομιδή. BBCH 15-89	3 με ελαχ. μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Τομάτα θερμοκηπίου	Περωνόσπορος Αλτερνάρια	-	40	20-150	Από το 5ο φύλλο ως την συγκομιδή. BBCH 15-89	4 με ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Μέγιστη Δόση 40γρ/στρ ανεξαρτήτως όγκου ψεκαστικού διαλύματος
Πεπόνι υπαίθρου	Περωνόσπορος	50	-	30-100	Από το 5ο φύλλο ως την συγκομιδή. BBCH 15-89	3 με ελαχ. μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Πεπόνι θερμοκηπίου	Περωνόσπορος	-	50	30-100	Από το 5ο φύλλο ως την συγκομιδή. BBCH 15-89	3 με ελαχ. μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Αγγούρι, αγγουράκι, κολοκυθάκι θερμοκηπίου	Περωνόσπορος	-	50	30-100	Από το 5ο φύλλο ως την συγκομιδή. BBCH 15-89	3 με ελαχ. μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Μελιτζάνα Υπαίθρου & θερμοκηπίου	Περωνόσπορος	40	-	20-100	Από το 5ο φύλλο ως την συγκομιδή. BBCH 15-89	3 με ελαχ. μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Πατάτα	Περωνόσπορος Αλτερνάρια	40	-	50-100	Εκπτυξη 1ου πλευρικού βλαστού ως το καφέτισμα του 50% των φύλλων. BBCH 21-95	4 με ελαχ. μεσοδιάστημα 7 ημέρες

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Αμπέλι	28
Πατάτα	14
Λοιπές καλλιέργειες	3

ΣΥΣΤΑΣΗ:

famoxadone: 22,5%β/β
cymoxanil: 30%β/β

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

εναιωρηματοποιήσιμοι
κόκκοι (WG)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: NTY PONT ELLAS A.E.

Μυκητοκτόνο επαφής και διεισδυτικό ευρέως φάσματος με προστατευτική και θεραπευτική (στο Φουζικλάδιο στα αρχικά στάδια της ασθένειας) δράση. Το FONTELIS® 20 SC αναστέλλει την αναπνοή των μυκήτων συνδεόμενο με το μιτοχονδριακό αναπνευστικό σύμπλεγμα II. Η δραστηριότητά του σταματά τη βλάστηση των σπορίων, την δημιουργία νέων σπορίων και αναστέλλει την ανάπτυξη του μυκηλίου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ	Φουζικλάδιο, Ωίδιο, Αλτερνάρια, Στεμφύλιο	112,5	75	100-150	Όταν αναμένεται εμφάνιση της ασθένειας από BBCH 10- έως το PHI. Σε περίπτωση εφαρμογών έως το τέλος της ανθοφορίας, χρησιμοποιήστε όγκο νερού 100-120 λίτρα/στρ (75-90 ml προϊόν/στρ).	2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες
ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΓΡΟΥ	Βοτρυτής	240	200	50-120	Από την έναρξη της ανθοφορίας όταν ο πρώτος ανθοφόρος οφθαλμός είναι ορατός μέχρι την πλήρη ωρίμανση BBCH 51 – 89. Ελάχιστη δόση 200 κ.εκ ανεξαρτήτως όγκου ψεκαστικού διαλύματος	1
ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ Θερμοκηπίου/ προστατευόμενα	Βοτρυτής	240 max (για μία εφαρμογή) 400 max (για 2 εφαρμογές, βλ. στήλη 7)	200	50-120	Από την έναρξη της ανθοφορίας όταν ο πρώτος ανθοφόρος οφθαλμός είναι ορατός μέχρι την πλήρη ωρίμανση BBCH 51 – 89	2 εφαρμογές με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες. Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 400 ml/στρ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν στη 2η εφαρμογή ψεκάσει με 120 λτ/στρ στην 1η θα πρέπει να έχει ψεκάσει με 80 λτ/στρ. Η δόση 200 ml/100 λτ ψεκ. υγρού παραμένει σταθερή.
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (με βρώσιμο φλοιό): Κολοκύθι (Υ), Αγγούρι (Υ)	Ωίδιο	240		50-120	Από την εμφάνιση των ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89)	1
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (με βρώσιμο φλοιό): Κολοκύθι (Θ), Αγγούρι (Θ)	Ωίδιο	100 (1η εφαρμογή) + 300 (2η εφαρμογή)		20-150	Από την εμφάνιση των ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89). Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 400 κ.εκ.σκευ./στρ.	2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες.
ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υπαίθρου): Μαρούλι, Σπανάκι, Λικοτρίβολο, Ρόκα, Κάρδαμο, Σέσκουλα	Βοτρυτής Σκληρωτίνιαση	150		20-100	Από το στάδιο της έκπτυξης του 10% των φύλλων έως την συγκομιδή. (BBCH 40-49)	1

ΠΙΠΕΡΙΑ (Θερμοκηπίου)	Βοτρύτης	100-200 (1η εφαρμογή) + 200-300 (2η εφαρμογή)		50-150	Από την εμφάνιση των ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89). Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 400 κ.εκ.σκευ./στρ.	2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια	Μονίλια	120		50-100	Για την καταπολέμηση της Μονίλιας συνιστάται 1 εφαρμογή κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. (BBCH 60-69)	2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.
	Ωίδιο	150			Για την καταπολέμηση του Ωιδίου, συνιστάται 1 εφαρμογή από την καρπόδεση έως το 90% της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 71-89)	
ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου/ Θερμοκηπίου)	Βοτρύτης	90		20 -100	Με την εμφάνιση των πρώτων ανθικών καταβολών στη βάση της ροζέτας μέχρι την συγκομιδή. (BBCH 55 – 89). Η συνιστώμενη δόση είναι 90 κ.εκ.σκευ./στρ. ανά εφαρμογή. Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 180 κ.εκ.σκευ./στρ.	2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ	21
ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (Υ), ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ), ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ)	1
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρι, Κολοκύθι) (Υ/Θ)	1
ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ που περιλαμβάνονται στο φάσμα δράσης (Υ)	14
ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ)	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια)	3
ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ/Θ)	1

ΣΥΣΤΑΣΗ:

penthiopyrad 20% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

συμπικνωμένο εναιώρημα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 60510/24.02.2016
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: NTY PONT ELLAS A.E.

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ενάντια στο ωίδιο αμπελιού, αγγουριού, κολοκυθιού, καρπουζιού, πεπονιού, φράουλας και μηλιάς. Εμφανίζει πολυθεσική δράση, στο επίπεδο της κυτταρικής αναπνοής παρεμποδίζοντας την αύξηση του μυκηλίου καθώς και την παραγωγή και βλάστηση των κονιδίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΥΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ
		κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού (max)	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ. (max)	κ. εκ/ στρ.		
Μηλιά	Ωίδιο	60	100	60	Από την αρχή της ανάπτυξης των φύλλων έως την αρχή της ανθοφορίας. (BBCH 10-60)	3/7-10
Αμπέλι (Οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)	Ωίδιο	40-60	100	40-60	Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές Από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την αλλαγή χρώματος των ραγών. (BBCH 13-81)	4/10
		60	100	60	Εξοντωτικές εφαρμογές: Από την έναρξη του κλεισίματος των βότρων μέχρι την αλλαγή χρώματος των ραγών. (BBCH 71-81)	2/5-6
Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι (Υ&Θ)	Ωίδιο	60	100	60	Εφαρμόζεται από το στάδιο των 5 φύλλων έως και 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή. (BBCH 15-85)	3/10
Φράουλα (Υ&Θ)	Ωίδιο Podosphaera macularis	60	100	60	Εφαρμόζεται από την εμφάνιση της ταξιανθίας έως και 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή. (BBCH 55-87)	3/10

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)	21
Αγγούρι, Καρπούζι (Υ & Θ) Κολοκύθι, Πεπόνι, Φράουλα (Υ & Θ)	3
Μηλιά	-

ΣΥΣΤΑΣΗ:

meptyldinocap 35% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΠΡΟΣΟΧΗ


ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Μείγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού (cytochanil) και ενός επαφής (mancozeb) με προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		γρ/ στρέμμα max	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο	Περωνόσπορος, Φόμοψη	375	300	50-125	Από το 5ο φύλλο μέχρι την το μαλάκωμα των ραγών. BBCH 15-85 Ελάχιστη δόση 300γρ/στρ ανεξαρτήτως όγκου ψεκ. διαλύματος.	4 με ελαχ. μεσοδιάστημα 7- 10 ημέρες
Τομάτα υπαίθρου	Περωνόσπορος, Αλτερναρια	300		50-100	Από το 3ο φύλλο ως την συγκομιδή. BBCH 13-89	5 με ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Κολοκυθάκι, Αγγούρι, Αγγουράκι υπαίθρου	Περωνόσπορος	300		50-100	Από το 5ο φύλλο ως την συγκομιδή. BBCH 15-89	4 με ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Πατάτα	Περωνόσπορος	300		30-100	Από το στάδιο που το 10% των φυτών σμίγουν μεταξύ των γραμμών ως το κιτρίνισμα των φύλλων. BBCH 30-90	5 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Αμπέλι	28
Πατάτα	7
Λοιπές καλλιέργειες	3

ΣΥΣΤΑΣΗ:
cytochanil 4% β/β
mancozeb 40% β/β

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
βρέξιμη σκόνη (WP)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 60.630/27.06.2017
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: NTY PONT ELLAS A.E.

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	γρ/ στρ (max)	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά - Nashi, Κυδωνιά, Μουσμουλιά	Φουζικλάδιο	65 -100	100	50-150	BBCH 10-80 Εφαρμογή από το στάδιο της «ρόδινης κορυφής» και την ανάπτυξη των φύλλων ως την ωρίμανση των καρπών.	4/7 μέρες
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσινιά	Φαιά Σήψη, Ωίδιο, Κυλινδροσπόριο κερασιάς, Σκωρίαση, Ανθράκωση	100-300	150	50-150	BBCH 11-87 Με το ξεδίπλωμα των φύλλων και την ανάπτυξη των βλαστών ως την ωρίμανση των καρπών.	4/10 μέρες
Αμυγδαλιά	Φαιά Σήψη	150-420	150	35-100	BBCH 57-69 Με την έκπτυξη των οφθαλμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης.	2/7 μέρες
Φιστικιά	Σεπτόρια, Σκωρίαση, Βοτρυοσφάρια	150-420	150	35-100	BBCH 57-69 Με την έκπτυξη των οφθαλμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης.	2/7 μέρες
Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) VITVI	Ωίδιο	75	75	100	(BBCH 13-80) Εφαρμογή πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ., και μέχρι της αλλαγής του χρώματος των ραγών, και ανάλογα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.	4/ 10-14 μέρες
Ελιά	Κυκλοκόνιο	150	150	80-100	(BBCH 11-59) Από την εποχή που διαχωρίζονται τα πρώτα φύλλα μέχρι και πριν την άνθηση. Αλλαγή χρώματος της στεφάνης από πράσινο σε λευκό (πριν ανοίξουν τα πρώτα άνθη).	1
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκυθάκια (Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ)	Ωίδιο	100-250	100	40-100	BBCH 13-89) Με την εμφάνιση 3 πραγματικών φύλλων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών.	3/8 μέρες

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΡΗΙ (ΗΜΕΡΕΣ)
Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά Nashi, Κυδωνιά, Μουσμουλιά	28
Αμυγδαλιά	120
Φυστικιά	120
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά	3

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΡΗΙ (ΗΜΕΡΕΣ)
Κερασιά, Βυσινιά	5
Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	28
Αγγούρι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκυθάκια (Υ)	3
Ελιά	Μη εφαρμόσιμο

ΣΥΣΤΑΣΗ:

fenbuconazole 5,00 % β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 60474/14.9.2015
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Το myclobutanil είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών. Δρα ως αναστολέας της βιοσύνθεσης των στερολών στους μύκητες. Έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ							
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΗΜΕΡΕΣ)	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
		κ.εκ/ στρ.	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ. (max)	κ. εκ/ 100 λίτρα νερό			
Μηλιά - Αχλαδιά	Ωίδιο	60-185	50-150	125	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της ασθένειας	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται	14 ημέρες
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά	Ωίδιο, Μονίλια	65-200	50-150	130	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της ασθένειας	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται	7 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζιο, οиноποιήσιμο)	Ωίδιο, Μαύρη σήψη	20-150	15-120	125 ²	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της ασθένειας	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται	14 ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο	65-165	40-100	165	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της ασθένειας	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται	3 ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα (Υπαίθρου)	Ωίδιο	65-165	40-100	165	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος	1 εφαρμογή	3 ημέρες
Πεπονιά, καρπουζιά (Υπαίθρου)	Ωίδιο	65-165	40-100	165	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος	1 εφαρμογή	
Αγγουριά, Αγγουράκι (Gherkin) Κολοκύθα - κολοκυθάκι (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο	65-165	40-100	165	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της ασθένειας	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται	3 ημέρες
Φράουλες (Υπαίθρου-Θερμοκηπίου)	Ωίδιο	55-130	40-100	130	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος από την περίοδο της άνθησης και μετά	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται	3 ημέρες
Καρυδιά, Φουντουκιά	Ανθράκωση	165	50-150	100-330	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της ασθένειας	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται	60 ημέρες
Καλλωπιστικά δένδρα, θάμνοι, σε φυτώρια	Ωίδιο, Σκωρίαση	80-165	50-100	165	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της ασθένειας	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο
Καλλωπιστικά άνθη (Χρυσάνθεμα, Γαρύφαλλα, Τριαντάφυλλα) (υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Ωίδιο, Σκωρίαση	80-165	50-100	165	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της ασθένειας	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο

ΣΥΣΤΑΣΗ:

myclobutanil 4.5 % (β/ο)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό (EW)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 60513/18.11.19
 ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S.

Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του Ωιδίου (*Uncinula necator*) στο αμπέλι. Το TALENDO® 20 EC περιέχει (proquinazid), ένα νέο μυκητοκτόνο της κατηγορίας των κουιναζολινών με καινοτόμο τρόπο δράσης. Το Proquinazid δρα προληπτικά παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων και το σχηματισμό απρεσπορίων του μύκητα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ/ στρ.	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.			
Αμπέλι Επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο	Ωίδιο	20-25	-	30-100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος, μεταξύ του σταδίου των 3 φύλλων (BBCH 13) έως και 28 ημέρες πριν την συγκομιδή.	10-14 ημέρες	2

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ
Σταφύλια	28

ΣΥΣΤΑΣΗ:
proquinazid 20% β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:
γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 60621/24.5.2017
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ

™ ® TRADEMARKS OF DOW AGROSCIENCES, DUPONT OR PIONEER,
AND THEIR AFFILIATED COMPANIES OR THEIR RESPECTIVE OWNERS. © 2020 CORTEVA.

Codacide EC

Το CODACIDE EC είναι επιφανειοδραστική ουσία με βάση φυτικό λάδι ελαιοκράμβης, που βελτιώνει την δράση και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων με τα οποία συνδυάζεται. Βελτιώνει την εναπόθεση και την κατανομή του ψεκαστικού υγρού καθώς και την διαβρεκτική ικανότητα και απορρόφηση των ζιζανιοκτόνων και μειώνει τη διασπορά των ψεκαστικών σταγονιδίων. Επίσης βελτιώνει την αντοχή στην έκπλυση από βροχή.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

rapessed oil 86,4 % β/ο
(95% β/β)

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

γαλακτωματοποιήσιμο
σκεύασμα (EC)

ΔΟΣΕΙΣ

125-250 κ.εκ./στρέμμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 2236

Surfer™ SL

Το SURFER™ είναι επιφανειοδραστική ουσία που βελτιώνει τη δράση και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων με τα οποία συνδυάζεται. Βελτιώνει την εναπόθεση και την κατανομή του ψεκαστικού υγρού καθώς και τη διαβρεκτική ικανότητα και απορρόφηση των ζιζανιοκτόνων και μειώνει τη διασπορά των ψεκαστικών σταγονιδίων. Επίσης βελτιώνει την αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή.

ΣΥΣΤΑΣΗ:

2-ethyl hexanol:72% β/ο
propylene glycol 18,5 % β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

Πυκνό διάλυμα

ΔΟΣΗ:

200 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 20510/2012

Trend® 90SL

Το TREND® 90 SL είναι μη ιονιζόμενη επιφανειοδραστική ουσία που ελαττώνει την επιφανειακή τάση και αυξάνει την προσκολλητική και διεισδυτική ικανότητα του ψεκαστικού διαλύματος στα φύλλα. Επιπλέον αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα δράσης ειδικά σε ζιζάνια που διαβρέχονται δύσκολα κάτω από ξηρές/ψυχρές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνιστάται η εφαρμογή του TREND 90 SL σε δόση 50-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος (0.05% -0.15% κατ' όγκον) σε ανάμειξη με το ζιζανιοκτόνο στην εγκεκριμένη δοσολογία.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

isodecyl alcohol ethoxylate
90 % β/ο

ΦΟΡΜΟΥΛΑ:

υδατοδιαλυτό υγρό (SL)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ε.Μ.Χ.Π.: 2289





ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΒΡΙΔΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ



P1921	P1524	P0023
P1758	P1672	P9911
PR31Y43	P1565	PR31A34
P2105	P1611	P2948W -
P1916	P1454 NEO	ΑΣΠΡΟ
P1772 NEO	P1049	ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
P2085 NEO	P0729	
P1570	P0937	



TM, ®, SM TRADEMARKS AND SERVICE MARKS OF DOW AGROSCIENCES, DUPONT OR PIONEER,
AND THEIR AFFILIATED COMPANIES OR THEIR RESPECTIVE OWNERS

P1921



P1758



P1921

FAO: 700

Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση:
130 - 135

- Μέγιστο δυναμικό παραγωγής.
- Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα.
- Ιδανική ομάδα με το P1758.

P1758

FAO: 700

Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση:
130 - 135

- Το πρώτο σε πωλήσεις υβρίδιο για πολλά χρόνια.
- Συνδυάζει άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερο δυναμικό παραγωγής.

P2105



P1916



PR31Y43

FAO: 700

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 135 - 140**

- Ο πρωταθλητής της ενσίρωσης για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια.
- Μέγιστο stay green.
- Δίνει το μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο κοπής για ενσίρωμα.

P2105

FAO: 700

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 135 -140**

- Μέγιστο δυναμικό παραγωγής σε υψηλών αποδόσεων, πρώιμα και στραγγερά χωράφια.
- Το μόνο υβρίδιο που ανταγωνίζεται το PR31Y43 στην ενσίρωση (στρεμματική απόδοση σε φρέσκο βάρος και ενέργεια για τα μηρυκαστικά).
- Ταχεία αποβολή της υγρασίας (dry down).

P1916

FAO: 700

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση:
135 - 140**

- Πολύ υψηλών αποδόσεων.
- Κατάλληλο για γόνιμα χωράφια και καλές συνθήκες.
- Γρήγορο dry down – χαμηλή υγρασία συγκομιδής.

P2085



P1772 NEO

FAO: 700

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 135 - 140**

- Ισχυρότατο στέλεχος.
Πρώιμη ανθοφορία.
- Μέγιστη αντοχή σε όλες
τις σημαντικές ασθένειες.
- Υψηλές αποδόσεις και
εξαιρετική ποιότητα καρπού.
- Άριστο για παραγωγή snack.

P2085 NEO

FAO: 700

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 135 - 140**

- Μέγιστο δυναμικό
παραγωγής.
- Όψιμο υβρίδιο
διπλής χρήσης.
- Ανθεκτικό σε όλες τις κύριες
μυκητολογικές ασθένειες
φυλλώματος και ρόκας.
- Εντυπωσιακή εικόνα
και ποιότητα καρπού.

P1570

FAO: 600

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 130**

- Μέγιστο ταβάνι απόδοσης
- Κατάλληλο για χωράφια
υψηλών αποδόσεων.
- Το υβρίδιο με τις περισσότερες
σειρές καρπού και
την μεγαλύτερη ευελιξία
στο μέγεθος της ρόκας.

P1524



P1672



P1565



P1524

FAO: 600

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 130**

- Κορυφαίο δυναμικό παραγωγής με την χαμηλότερη υγρασία συγκομιδής της κατηγορίας.
- Σταθερά υψηλές αποδόσεις.
- Ισχυρό στέλεχος και ευρεία προσαρμοστική ικανότητα.

P1672

FAO: 600

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 130**

- Υψηλές αποδόσεις και ισχυρά αγρονομικά που του επιτρέπουν και όψιμες σπορές.
- Ισχυρό στέλεχος και ριζικό σύστημα.
- Χαμηλή υγρασία συγκομιδής.

P1565

FAO: 600

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 130**

- Το υβρίδιο με την ισχυρότερη ρίζα και το πιο δυνατό στέλεχος.
- Έντονο stay green.
- Ανθεκτικό στις ξηροθερμικές συνθήκες.
- Άριστο για παραγωγή σιμιγδαλιού.

P1611



P1454



P1611

FAO: 600

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 130**

- Συμπαγές και ισορροπημένο φυτό.
- Ξεχώρισε το 2018 στη Β. Ελλάδα.
- Έντονο stay green. Μέγιστη αντοχή στο Ελμινθοσπόριο.
- Κορυφαία ποιότητα καρπού.

P1454 NEO

FAO: 600

Ημέρες για φυσιολογική ωρίμανση: 130

- Μέγιστο δυναμικό παραγωγής.
- Εξαιρετική ποιότητα καρπού.
- Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα.



P1049 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Optimum® AQUAmax®



FAO: 500

Ημέρες για φυσιολογική

ωρίμανση: 120 - 125

- Κορυφαίες αποδόσεις σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος.
- Συμπαγές φυτό με ισχυρό στέλεχος.
- Ανθεκτικό στο Ελμινθοσπόριο και το Γυμνό Άνθρακα.
- Μέγιστη αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες.
- Έντονο stay green.
- Μεγάλη ρόκα με πολλές σειρές καρπών.
- Κατάλληλο για πυκνή σπορά.
- Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς: 14 - 15 εκ. x 75 εκ.

Οι περιορισμοί στην άρδευση είτε στο χρόνο εφαρμογής, είτε στην ποσότητα του νερού εντείνονται με την πάροδο των ετών.

Η νέα τεχνολογία Optimum® AQUAmax® είναι η λύση για μείωση του κινδύνου και σταθεροποίηση της απόδοσης σε ξηροθερμικές συνθήκες και συνθήκες παροδικής έλλειψης νερού. Καλλιεργώντας Optimum® AQUAmax® υβρίδια καλαμποκιού έχουμε:

- 5% μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τη χρήση άλλων υβριδίων.
- Πιο σταθερή φωτοσύνθεση.
- Έντονο μετάξιωμα.
- Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας.
- Συγκράτηση νερού στο υπέργειο τμήμα του φυτού.
- Καλύτερη απορρόφηση νερού από το έδαφος

Με τη χρήση υβριδίων Optimum® AQUAmax® ο παραγωγός μπορεί να:

- να επιλέξει με μεγαλύτερη ασφάλεια την πυκνότητα σποράς που του δίνει το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.
- να καλλιεργήσει περισσότερα στρέμματα καλαμποκι.
- να μειώσει το ρίσκο μιας κακής χρονιάς.

Λιγότερη Υγρασία – Περισσότερα Κιλά

Ο χρόνος συγκομιδής του καλαμποκιού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για τον παραγωγό. Επηρεάζει την κερδοφορία του, καθώς πρέπει να βρει ισορροπία μεταξύ της μεγιστοποίησης της παραγωγής και της ελαχιστοποίησης του κόστους ξήρανσης και του ρίσκου από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Πρώρη συγκομιδή με υψηλή υγρασία καρπού οδηγεί σε απώλεια παραγωγής και ποιότητας, καθώς και αύξηση του κόστους ξήρανσης. Καθυστερημένη συγκομιδή καταλήγει σε φθορές, μείωση απόδοσης και ανάπτυξη ανεπιθύμητων παρασίων και ασθενειών που μειώνουν την εμπορική αξία του καρπού και την αποθηκευτική του ικανότητα. Η Pioneer έχει αναπτύξει υβρίδια νέας τεχνολογίας με κύκλο 120 - 125 ημέρες που έχουν το ίδιο ή μεγαλύτερο δυναμικό παραγωγής (από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα όσιμα υβρίδια) και ταυτόχρονα συγκομίζονται νωρίτερα με μικρότερη υγρασία συγκομιδής, ποιότητα Pioneer και μικρότερο ή καθόλου κόστος ξήρανσης.

P0943



P0937



P0023



P0729

FAO: 500

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 120 - 125**

- Το υβρίδιο που συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις της κατηγορίας του, με ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά και την καλύτερη ποιότητα καρπού.
- Χαμηλό φυτό.
- Χαμηλή υγρασία συγκομιδής.

P0937

FAO: 500

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 120 - 125**

- Εξαιρετικές αποδόσεις.
- Χαμηλή υγρασία συγκομιδής.
- Ισορροπημένο φυτό. Κατάλληλο για υψηλών αποδόσεων περιβάλλοντα.

P0023

FAO: 400

**Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 100 -105**

- Πολύ μεγάλο δυναμικό παραγωγής.
- Ισορροπημένο φυτό με συμπαγή ρόκα.
- Ανθεκτικό στην ελλιπή άρδευση.



Άσπρο καλαμπόκι

P9911

FAO: 350
Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 95 - 100

- Εύσωμο φυτό.
- Έντονο dry down.
- Ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά.

PR31A34

FAO: 700
Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: 135 - 140

- Πολύ ισχυρό στέλεχος.
Μέγιστο stay green.
- Καλή αντοχή στη σεζάμια και την πυραλίδα.
- Παραγωγή ενσιρώματος με μέγιστη περιεκτικότητα σε άμυλο.

P2948W

FAO: 800
Ημέρες για φυσιολογική
ωρίμανση: +140

- Μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις.
- Μέγιστο ύψος, φρέσκο βάρος και stay green.
- Λευκός καρπός.

ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ



ST 318	ST 457
ST 402	ST 474
ST 405	ST 463
ST 373	IDEAL



TM, ®, SM TRADEMARKS AND SERVICE MARKS OF DOW AGROSCIENCES, DUPONT OR PIONEER,
AND THEIR AFFILIATED COMPANIES OR THEIR RESPECTIVE OWNERS

ST 318



ST 402



Πρώιμες – Ευρείας Προσαρμοστικότητας – Μέγιστη Στρεμματική Παραγωγή Σύσπορου και Ίνας

ST 318

- Λείο φύλλο και βαρύ καρύδι.
- Πρώιμη ανθοφορία, με πρώιμο και δυνατό άνοιγμα καρυδιών.
- Πολύ καλή συγκράτηση καρποφόρων και εύκολη διαχείριση της φυτείας.
- Κατάλληλη και για γόνιμα χωράφια ξηρικής ή ημιξηρικής καλλιέργειας.
- Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης.
- Υψηλή απόδοση σε ίνα > 38%.
- Διατίθεται και με επένδυση **Genius Coat** για άριστη φυτρωτικότητα και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.
- Ιδανική επιλογή για Πρόγραμμα Ικνηλασιμότητας και Ποιότητας CottonBest®

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών: 20 – 22 φυτά/μέτρο.

ST 402

- Αραιό φύλλωμα που βοηθάει στον έλεγχο του πράσινου σκουληκιού.
- Ταχεία αναπαραγωγή καρποφόρων οργάνων.
- Εύκολη διαχείριση και ανεκτικότητα σε καλλιεργητικά λάθη.
- Διατίθεται και με επένδυση **Genius Coat** για άριστη φυτρωτικότητα και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών: 20 – 22 φυτά/μέτρο.

ST 405



Εύρωστες - Μεσοπρώιμες

ST 405

- Υψηλές αποδόσεις σε γόνιμα χωράφια.
- Η βλαστική της ανάπτυξη ελέγχεται εύκολα, ακόμα και με μικρές δόσεις ρυθμιστών.
- Υψηλή απόδοση σε ίνα > 38%.
- Διατίθεται με επένδυση **Genius Coat** για άριστη φυτρωτικότητα και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών:
20 – 22 φυτά/μέτρο.

ST 373

- Σχετικά πρώιμο άνοιγμα. Μεγάλο βάρος καρυδιών.
- Ταχεία αναπλήρωση χαμένων καρποφόρων οργάνων.
- Κατάλληλα για χωράφια ξηρικής ή ημιξηρικής καλλιέργειας στη Β.Ελλάδα.
- Υψηλή απόδοση σε ίνα > 37,5%.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών:
15 – 25 φυτά/μέτρο.

ST 457

- Συγκράτηση φύλλων και γέμισμα καρυδιών ως το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.
- Μεγάλη απόδοση υψηλής ποιότητας ίνας ανά στρέμμα.
- Υψηλή απόδοση σε ίνα > 36,5%.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών:
15 – 25 φυτά/μέτρο.

ST 474



ST 463



Εύρωστες - Μεσοπρώιμες Μεγάλες αντοχές - Δυνατά φυτά

ST 474

- Υψηλή παραγωγή, ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες.
- Μεσοπρώιμη με εξαιρετική παραγωγικότητα, γρήγορο φύτρωμα και ισχυρή πρώτη ανάπτυξη.
- Εύρωστο φυτό, τρίχωμα στα φύλλα, ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστημα.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών:
15 – 28 φυτά/μέτρο.

ST 463

- Εύρωστο φυτό μεγάλου ύψους, με εξαιρετικό φύτρωμα και πρώτη ανάπτυξη.
- Αντοχή στην ελλιπή άρδευση και την αδρομύκωση.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών:
22 – 25 φυτά/μέτρο.

IDEAL

- Εύρωστο και δυνατό φυτό.
- Ανθεκτική στην αδρομύκωση.
- Εξαιρετική ποιότητα ίνας.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών:
15 – 25 φυτά/μέτρο.

ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ



- Μέγιστο δυναμικό παραγωγής.
- Γενετική αντοχή στην Οροβάγχη (Pioneer Protector® broomrape resistance).
- Γενετική αντοχή στον Περονόσπορο (Pioneer Protector® downy mildew resistance).
- Αυξημένη περιεκτικότητα σε λάδι.

Επιπλέον ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει ανάλογα με το σύστημα ζιζανιοκτονίας (Clearfield® Plus, DuPont™ Express Sun®) το κατάλληλο υβρίδιο.

P64LE99
P64LE25
P63LE113
P64LE136 NEO
P64LC108

P64LP130 NEO
P64HE118 NEO
P64HE133 NEO
P64HE144 NEO



®, TM, TRADEMARKS OF DUPONT, DOW AGROSCIENCES OR PIONEER AND THEIR AFFILIATED COMPANIES OR THEIR RESPECTIVE OWNERS. TO CLEARFIELD® ΚΑΙ TO CLEARFIELD® PLUS ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΗΣ BASF



P64LE99

Ο κυρίαρχος στα ποτιστικά - κορυφαίες αποδόσεις

RM 47

- Μέγιστο δυναμικό παραγωγής σε γόνιμα χωράφια.
- Νέα τεχνολογία βασισμένη στο P64LE25.
- Υβρίδιο τεχνολογίας DuPont™ Express Sun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG.
- Πολύ ισχυρό στέλεχος.
- Επίπεδη πίτα με πλήρη γονιμοποίηση μέχρι το κέντρο.
- Εξαιρετικό φύτρωμα και γρήγορη κάλυψη του εδάφους.
- Αντοχή στο πλάγισμα.
- Μεγάλη αντοχή σε ασθένειες, όπως φόμοψη και σκληρωτίνια (ρίζα και κεφάλι)

P64LE25

Το υβρίδιο που κάνει την διαφορά σε όλες τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης

RM 43

- Υβρίδιο τεχνολογίας DuPont™ Express Sun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG.
- Μεγάλη σταθερότητα απόδοσης σε ποτιστικά και ξηρικά.
- Εξαιρετικό φύτρωμα, εύρωστο φυτό, δυνατή ρίζα.
- Επίπεδη πίτα με πλήρη γονιμοποίηση μέχρι το κέντρο.
- Μεγάλη αντοχή σε ασθένειες, όπως φόμοψη και σκληρωτίνια (ρίζα και κεφάλι).
- Μεγάλος καρπός με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
- Ιδανικό για όλα τα ποτιστικά χωράφια και τα γόνιμα ξηρικά.
- Κατάλληλο για πρώιμη και όψιμη σπορά.

P63LE113



P64LE136



P63LE113

Για πρώιμες και όψιμες σπορές σε ποτιστικά και σε αδύνατα

RM 42

- Υβρίδιο τεχνολογίας DuPont™Express Sun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG.
- Πρώιμη ανθοφορία.
- Μεγάλο δυναμικό παραγωγής
- Ζωηρό – πράσινο φυτό με μεγάλο φύλλο και χαμηλό σχετικά ύψος.
- Πολύ ισχυρό στέλεχος.
- Επίπεδη πίτα με πλήρη γονιμοποίηση μέχρι το κέντρο.
- Μεγάλη αντοχή σε ασθένειες, όπως φόμοψη και σκληρωτίνια (ρίζα και κεφάλι).
- Μεγάλη περιεκτικότητα σε λάδι.
- Κατάλληλο για πρώιμες και πυκνές σπορές.

P64LE136 NEO

RM 44

- Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα
- Μέγιστο δυναμικό παραγωγής σε γόνιμα χωράφια.
- Σχετικά χαμηλή υγρασία συγκομιδής.
- Ανθεκτικό στις κύριες ασθένειες και την Οροβάγχη.
- Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
- Υβρίδιο τεχνολογίας DuPont™Express Sun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG.



P64LC108

Το ανθεκτικότερο υβρίδιο στην ξηρασία και το πιο παραγωγικό σε αδύνατα μπαϊρία

RM 45

- Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Pulsar® 4 SL
- Εκπληκτικά κιλά σε κάμπους απότιστο ή με ένα νερό.
- Άνοσο στην οροβάγχη και Περονόσπορο.
- Έχει την ταχύτερη πρώτη ανάπτυξη.
- Μέγιστη περιεκτικότητα σε λάδι.

P64LP130 NEO

Το Νο 1 υβρίδιο σε % ποσοστό λαδιού

RM 45

- Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield® Plus με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Pulsar® Plus.
- Γενετική αντοχή στον Περονόσπορο και την Οροβάγχη.
- Εύρωστο φυτό.
- Εξαιρετικές αποδόσεις στη λεκάνη της Μεσογείου και τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

HIGH OLEIC

P64HE133



P64HE118 NEO

High Oleic υβρίδιο

RM45

- Υβρίδιο τεχνολογίας DuPont™Express Sun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG.
- Έχει το υψηλότερο ποσοστό Ολεϊκού οξέος (>90%).
- Ανθεκτικό στις κυριότερες ασθένειες.

P64HE133 NEO

High Oleic

RM 44

- Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
- Άριστη ποιότητα λαδιού.
- Ανθεκτικό στον Περονόσπορο.
- Υβρίδιο τεχνολογίας DuPont™Express Sun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG.

P64HE144 NEO

High Oleic

RM 45

- Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
- Άριστη ποιότητα λαδιού.
- Ανθεκτικό στον Περονόσπορο.
- Υβρίδιο τεχνολογίας DuPont™Express Sun® με αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG.

ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ



PT264 NEO
PT275 NEO
PT200 CL
PT228 CL
PT279 CL NEO



TM, ®, SM TRADEMARKS AND SERVICE MARKS OF DOW AGROSCIENCES, DUPONT OR PIONEER,
AND THEIR AFFILIATED COMPANIES OR THEIR RESPECTIVE OWNERS

PT264



PT264 NEO

- Η υψηλότερη στρεμματική παραγωγή στην Ευρώπη.
- Μεγάλη προσαρμοστικότητα.
- Μέγιστη ευρωσσία την περίοδο της Άνοιξης.
- Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε πρωτεΐνη.

PT275 NEO

- Μεσοόψιμο υβρίδιο.
- Ανθεκτικό στο βαρύ χειμώνα.
- Ανθεκτικό στη Φόμα.
- Μέγιστο δυναμικό παραγωγής.
- Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι.

PT200 CL*



PT228 CL



PT279 CL*



PT200 CL*

- Μεσοπρώιμο υβρίδιο.
- Εύρωστο φυτό με ισορροπημένα μεσογονάτια.
- Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα.
- Μέγιστη περιεκτικότητα % σε πρωτεΐνη.
- Σύστημα ζιζανιοκτονίας Clearfield.

PT228 CL*

- Πολύ ομοιόμορφη άνθηση και ωρίμανση.
- Μικρότερη υγρασία συγκομιδής.
- Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι.
- Σύστημα ζιζανιοκτονίας Clearfield.

PT279 CL* NEO

- Μεσοόψιμο υβρίδιο με ακόμη μεγαλύτερο δυναμικό παραγωγής
- Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι και πρωτεΐνη.
- Σύστημα ζιζανιοκτονίας Clearfield.

ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΗΔΙΚΗΣ



Χαρακτηριστικά

- Ορθοτενής ανάπτυξη.
- Εύσωμα φυτά.
- Μικρής διάρκειας λήθαργος.
- Ταχεία αναβλάστηση.
- Αντοχή στο ψύχος και τις σημαντικότερες ασθένειες.
- Μεγάλη αναλογία φύλλων.

GUILIA & PR57Q53
BLUE MOON



GUILIA & PR57Q53



BLUE MOON



GUILIA & PR57Q53

- Ισχυρό ριζικό σύστημα.
- Ταχεία αναβλάστηση.
- Μεγαλύτερη αντοχή στην έλλειψη νερού (GUILIA).
- Υψηλή παραγωγή και άριστη ποιότητα.

BLUE MOON

- Μέγιστο ύψος.
- Μέγιστη αναλογία φύλλων.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ελάχιστο λήθαργο.

ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΟΓΙΑΣ



PIONEER®

PR92B63
P21T45



TM, ®, SM TRADEMARKS AND SERVICE MARKS OF DOW AGROSCIENCES,
DUPONT OR PIONEER, AND THEIR AFFILIATED COMPANIES OR THEIR RESPECTIVE OWNERS

PR92B63



P21T45



PR92B63

Βιολογικός Κύκλος 1+

- Η ευρεία προσαρμοστικότητα της και ο βιολογικός της κύκλος οδηγούν στην επίτευξη μεγάλων στρεμματικών αποδόσεων.
- Εξαιρετική προσαρμογή σε σειρές σποράς των 75εκ.
- Πλούσια βλάστηση και διακλάδωση.
- Καλή αντοχή στο πλάγιασμα. Μεγάλη αντοχή στο stress και τα δύσκολα εδάφη.
- Προσαρμόζεται καλά σε πυκνές φυτείες και σε βαριά ή συμπαγή εδάφη.

P21T45

Βιολογικός Κύκλος 1

- Μέγιστο δυναμικό παραγωγής για το βιολογικό κύκλο 1 και ιδιαίτερα σταθερή στις αποδόσεις.
- Ζωηρή και έντονη πρώτη ανάπτυξη.
- Μέσου ύψους συμπαγές φυτό.
- Άριστη αντοχή στο πλάγιασμα.
- Υγιές φυτό ανθεκτικό στον περονόσπορο και άλλες μυκητολογικές ασθένειες.
- Ταχεία ωρίμανση και φυσική αποφύλλωση.
- Ευρεία προσαρμοστική ικανότητα σε διάφορους τύπους εδαφών.
- Προσαρμοστικότητα σε διάφορες τεχνικές σποράς και στενές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών.

ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΒΡΙΔΙΑ ΣΟΡΓΟΥ



PIONEER®

PR823F
NICOL



TM, ®, SM TRADEMARKS AND SERVICE MARKS OF DOW AGROSCIENCES,
DUPONT OR PIONEER, AND THEIR AFFILIATED COMPANIES OR THEIR RESPECTIVE OWNERS



PR823F

(*Sorghum bicolor* x *Sorghum bicolor*)

- Υψηλές αποδόσεις βιομάζας ακόμα και σε συνθήκες χαμηλών εισροών.
- Φυτό μεγάλου ύψους.
- Καλή δυνατότητα αδελφώματος.
- Καλή αντοχή στο πλάγιασμα.
- Γρήγορη απώλεια υγρασίας κατά την ωρίμανση.
- Ανθεκτικό στις κυριότερες μυκητολογικές ασθένειες.
- Ισορροπημένο φυτό με πλούσια φυλλική επιφάνεια και καλό μέγεθος φόβης.
- Βαθύ και ισχυρό ριζικό σύστημα.
- Μεγάλο παράθυρο σποράς.
- Ιδανικό για υψηλής ποιότητας ζωτροφές- ενσιρώματα.
- Ιδανική πρώτη ύλη για μονάδες παραγωγής βιοαερίου.

NICOL

(*Sorghum bicolor* x *Sorghum sudagrass*)

- Ο βασιλιάς των πολλαπλών κοπών
- Ισχυρή και ταχεία αναβλάστηση μετά την κοπή ή τη βόσκηση.
- Υψηλή παραγωγή βιομάζας.
- Ισχυρό αδελφωμα.
- Στελέχη πλούσια σε σάκχαρα
- Ιδανική αναλογία στελεχών/ φύλλων.
- Εύγευστη κτηνοτροφία.
- Ανθεκτικό στις κυριότερες μυκητολογικές ασθένειες.
- Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικίλα περιβάλλοντα.
- Ιδανικό για επίσπορη καλλιέργεια.
- Ιδανική λύση για άγονα χωράφια.

ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ - ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ACHILLE)
ΛΑΖΑΡΟ (LAZARO)
ΑΦΡΙΚΑ (AFRICA)
ΛΟΥΤΕΣ (LUTECE)
ΠΛΑΝΕΤ (RGT PLANET)





ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ACHILLE)

- Ποικιλία ευρείας προσαρμοστικότητας.
- Ιδιαίτερα σταθερή ως προς την παραγωγική της συμπεριφορά.
- Υπερτερεί των άλλων ποικιλιών τόσο στα χαμηλής, όσο και στα υψηλής γονιμότητας περιβάλλοντα.
- Πολύ υψηλή απόδοση. Κορυφαίο εκατολιτρικό βάρος και υαλώδες.
- Διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την πολύ καλή ποιότητα καρπού και μετά τη βροχή.

Αγρονομικά Χαρακτηριστικά

- Καλή έως πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
- Φυτό με ορθοτενή ανάπτυξη, με σκούρου χρώματος φύλλο και καλό αδέλφωμα.
- Καλή συμπεριφορά στις χειμερινές θερμοκρασίες.
- Μέσου κύκλου ωρίμανσης.
- Μέσο προς ψηλό φυτό με μακρύ συμπαγή στάχυ.
- Ανθεκτικό στη Σεπτόρια, μέση αντοχή στις λοιπές βασικές μυκητολογικές ασθένειες.
- Άγανα μαύρα μακριά και πυκνά.

Μέση συνιστώμενη πυκνότητα σποράς για τις ποικιλίες σκληρού σιταριού 22 – 23 κιλά/στρ.

ΛΑΖΑΡΟ (LAZARO)



ΜΑΛΑΚΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

ΛΑΖΑΡΟ (LAZARO)

- Ποικιλία ευρείας προσαρμοστικότητας.
- Υπερτερεί της μέσης απόδοσης των πειραματικών αγρών σε όλα τα περιβάλλοντα, ειδικά σε χωράφια υψηλών αποδόσεων.
- Πολύ σταθερή ποικιλία ως προς την παραγωγική της συμπεριφορά.
- Ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Αγρονομικά Χαρακτηριστικά

- Καλή πρώτη ανάπτυξη.
- Ορθόφυλλο φυτό με έντονο αδέλφωμα.
- Πολύ καλή συμπεριφορά στις χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες.
- Μεσοόψιμη άνθιση - γρήγορο γέμισμα καρπών.
- Γόνιμος συμπαγής στάχυς με σταθερό μέγεθος.

ΑΦΡΙΚΑ (AFRICA)

- Μεσοόψιμη ποικιλία με μέγιστο δυναμικό παραγωγής.
- Μέσο ύψος φυτού, πολύ έντονο αδέλφωμα και ομοιόμορφο μέγεθος στάχυ.
- Το φυτό διατηρείται πράσινο και λειτουργικό μέχρι το τέλος της καλλιέργειας και λίγο πριν την ωρίμανση συγκομιδής.
- Ανθεκτική στο πλάγισμα και το ψύχος.
- Ανθεκτική στην Καστανή και την Κίτρινη Σκωρίαση, το Ωίδιο και τη Φουζαρίωση.
- Εκατολιτρικό βάρος: 76-80 κιλά.
- Αυξημένο βάρος 1.000 κόκκων.
- Μέση συνιστώμενη πυκνότητα σποράς για τις ποικιλίες μαλακού σιταριού 20 κιλά/στρ.



ΚΡΙΘΑΡΙΑ

ΛΟΥΤΕΣ (LUTECE)

- Μεσοπρώιμη ποικιλία εξάστοιχου κριθαριού.
- Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.
- Ψηλό φυτό.
- Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
- Καλή αντοχή στο ψύχος.
- Ανθεκτική στις κυριότερες ασθένειες.

ΠΛΑΝΕΤ (RGT PLANET)

- Νέα ποικιλία υψηλών αποδόσεων. Άριστα βυνοποιητικά χαρακτηριστικά.
- Σταθερές αποδόσεις και άριστη ποιότητα καρπού.
- Το ταχύτερα ανερχόμενο κριθάρι στην Ευρώπη για παραγωγή βύνης.

ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΒΡΙΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

DEXTER F1
FABER F1
ISI 23804 F1
FOSTER F1
VOLARE F1
SAILOR F1



DEXTER F1



FABER F1



ISI 23804 F1



DEXTER F1

- Μεσοπρώιμο υβρίδιο και το πιο κατάλληλο για τις πρώιμες φυτεύσεις.
- Εξαιρετικά δυνατό και ανθεκτικό στο ψύχος και τα βακτήρια.
- Καρποί με παχιά και σκληρά τοιχώματα κι έντονο κόκκινο χρώμα.

Ανθεκτικότητες: Pst, Fol, V, N

FABER F1

- Πολύ μεγάλη διάρκεια παραμονής στο χωράφι.
- Μεσοόψιμο υβρίδιο. Πολύ ζωνρό φυτό υψηλής παραγωγικότητας.
- Καρποί σκληροί με μεγάλη αντοχή στην υπερωρίμανση.

Ανθεκτικότητες: Fol, V, Cmm (clavibacter), N

ISI 23804 F1

- Μεσοπρώιμο υβρίδιο και μεγαλόκαρπο (75 – 85 γρ.)
- Ζωνρό και υγιές φυτό κατάλληλο για τις πρώιμες φυτεύσεις.
- Καρποί σκληροί με έντονο κόκκινο χρώμα και σταθερά υψηλό Brix.

Ανθεκτικότητες: Pst, Fol, V, N

FOSTER F1



VOLARE F1



SAILOR F1



FOSTER F1

- Υβρίδιο μεσόκαρπο (65 – 70 γρ.) κατάλληλο για μεσαίες και όψιμες φυτεύσεις.
- Ζωηρό και ισορροπημένο φυτό με πολύ υψηλές παραγωγές.
- Καρποί με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο χωράφι.

Ανθεκτικότητες: TSWV, V, Fol, V, Cmm (clavibacter), N

VOLARE F1

- Υβρίδιο πρώιμο, μικρόκαρπο (40-50 γρ.) τύπου μεγάλου τσέρι.
- Φυτό ζωηρό, άγριο & ανθεκτικό στα βακτήρια και το ψύχος.
- Καρποί στρογγυλοί, πολύ σκληροί με εξαιρετική γεύση και άρωμα, κατάλληλοι για ειδικές χρήσεις και για την επιτραπέζια αγορά.
- Υβρίδιο με υψηλό λυκοπένιο και Brix>5!

Ανθεκτικότητες: TSWV, Pst, Fol, V, N

SAILOR F1

- Νέο υβρίδιο με ανθεκτικότητα στον Περονόσπορο.
- Εξαιρετικά δυνατό και ανθεκτικό φυτό με πολύ υψηλές παραγωγές.
- Καρποί σκληροί με έντονο κόκκινο χρώμα.

Ανθεκτικότητες: Pst, Fol, V, Pi (Περονόσπορος), N





ΣΠΟΡΟΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ToMV: Tomato mosaic virus

TYLCV: Tomato Yellow leaf curl virus

TSWV: Tomato spotted wilt virus race o

Fl: Fulvia fulva (Cladosporium fulvum)

Lt: Leveillula taurica

Va/Vd: Verticillium albo-atrum / Verticillium dahliae

Fol: Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

For: Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici

Ma/Mi/Mj: Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica

ZYMV: Zucchini yellow mosaic virus

CMV: Cucumber mosaic virus

(HR): High resistance, (IR): Intermediate resistance

CYDN: Cucurbit Yellow Stunting Disease Virus

ΣΠΟΡΟΙ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΒΡΙΔΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

EXESIA F1
BOTERO F1
ROSALINDA F1
NICAREDDHU F1
KARDOULA F1
TRILLY F1
ISI 82360 F1
PROXY F1
SALADYN F1
BLONDY F1
MELANGE F1
DOLLY F1



EXESIA F1

BOTERO F1

ROSALINDA F1



Beef

Τσαμπί

Poż beef

EXESIA F1

Φυτό: Αραιόφυλλο με πλούσιο και δυνατό ριζικό σύστημα, υψηλής παραγωγής.

Καρποί: Σχήμα μήλου, γευστικοί, 280-380 γρ., ανθεκτικοί στο κούφωμα με μεγάλη διατηρησιμότητα. Απουσία ξύλου και πράσινης ράχης.

Προτεινόμενες φυτεύσεις: Αύγουστος-Σεπτέμβριος και Ιανουάριος-Απρίλιος.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV₀₋₂ / Fol₁ / TSWV₀ / Va₀ / Vd₀ / Ff / For (IR) TYLCV / Ma / Mi / Mj

BOTERO F1

Φυτό: Ζωηρό, με κοντά μεσογονάτια, κατάλληλο και για διαχείμαση.

Ομοιόμορφες ταξιανθίες ψαροκόκαλο 5-6 καρπών.

Καρποί: 160-180 γρ., ανθεκτικοί στο σκάσιμο, με λαμπερό χρώμα και μεγάλη διατηρησιμότητα.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV / TSWV / Fol_{0,1} / Vd₀ (IR) TYLCV / Ma / Mi / Mj.

ROSALINDA F1

Φυτό: Ζωηρό, με μεγάλες ταξιανθίες, κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.

Καρποί: Πολύ γευστικοί, σαρκώδεις και εξαιρετικά λεπτόφλουδοι, τύπου ντόπιας.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV / Fol₀ / Va₀ / Vd₀

NICAREDDHU F1



KARDOULA F1



TRILLY F1



Cherry τσαμπί

Cocktail οβάλ

Βελανίδι

NICAREDDHU F1

Φυτό: Ζωηρό, με πολύ κοντά μεσογονάτια και υψηλή παραγωγικότητα.

Καρποί: 15-20 γρ., διάμετρος 25-35 mm. Έντονο κόκκινο χρώμα και πολύ γλυκιά γεύση (Brix>8). Υψηλή αντοχή στο σκάσιμο. Μοναδικός κάλυκας αστέρι.

Το πλέον κατάλληλο για συγκομιδή και σε τσαμπί (δεν μαδάει)!

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV: / Fol:1,2 (IR) TYLCV.

KARDOULA F1

Φυτό: Ζωηρό και παραγωγικό, με ταξιανθίες 8-12 καρπών.

Καρποί: 30-40 γρ., πολύ γευστικοί. Έντονο κόκκινο χρώμα και μεγάλη διατηρησιμότητα.

Προτεινόμενες φυτεύσεις: Αύγουστος-Οκτώβριος και Ιανουάριος-Απρίλιος.

Κατάλληλο και για συγκομιδή τσαμπιών μετά τον Οκτώβριο.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:1,2 (IR) TYLCV.

TRILLY F1

Φυτό: Ισορροπημένο, με διπλές-τετραπλές ταξιανθίες.

Το πλέον παραγωγικό βελανίδι της αγοράς.

Καρποί: Πολύ γευστικοί (20-25 γρ.), με έντονο κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινες ράχες.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:0,1 (IR) Ma / Mi / Mj

ISI 82360 F1



PROXY F1



SALADYN F1



Βελανίδι

Plum τσαμπί

Ρόμα

ISI 82360 F1

Φυτό: Ισορροπημένο και αραιόφυλλο, με πολλαπλές ταξιανθίες σε όλη την παραγωγική περίοδο.

Καρποί: Πολύ νόστιμοι, σκληροί, πλήρως ανθεκτικοί στο σκάσιμο, με ζωηρό κόκκινο χρώμα. Απουσία πράσινης ράχης ακόμη και σε πολύ θερμές περιόδους.

Κατάλληλο και για συλλογή τσαμπιών.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:₀₋₂ / Fol:_{0,1} (IR) TYLCV/ Ma / Mi / Mj

PROXY F1

Φυτό: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό, κατάλληλο για διαχείμαση σε θερμοκήπιο και υπαίθρια καλλιέργεια.

Καρποί: 30-40 γρ., πολύ νόστιμοι, σκληροί και ανθεκτικοί. Ζωηρό κόκκινο χρώμα. Συνιστάται για συλλογή τσαμπιών (ψαροκόκκαλο).

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:₀₋₂ / Va:₀ / Vd:₀ / Fol:_{0,1} (IR) TYLCV/ Ma / Mi / Mj

SALADYN F1

Φυτό: Ζωηρό, με μεγάλες ταξιανθίες, κατάλληλο για διαχείμαση.

Καρποί: 110-130 γρ., έντονο κόκκινο χρώμα και αντοχή στο σκάσιμο. Εξαιρετική γεύση.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:_{0,1} / Va:₀ / Vd:₀ (IR) TYLCV/ Lt / Ma / Mi / Mj.

BLONDY F1



MELANGE F1



DOLLY F1



Mini plum

Mini plum

BLONDY F1

Φυτό: Πρώιμο, μέτριας ζωνρότητας, υψηλής παραγωγής.

Καρποί: Πολύ νόστιμοι και ανθεκτικοί, με έντονο πορτοκαλί χρώμα. Σάρκα τραγανή, γλυκιά και πολύ αρωματική, με μεγάλη περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και β-καροτένιο.

Ανθεκτικότητες: (HR) Fol:_{0,1}

MELANGE F1

Φυτό: Μέτριας ζωνρότητας, με κοντά μεσογονάτια.

Καρποί: Οβάλ, πολύ νόστιμοι, σκληροί και ανθεκτικοί με ζωνρό καστανοκαφέ χρώμα και πράσινες ραβδώσεις (τιγρέ). Σάρκα αρωματική, κόκκινου-μωβ χρώματος.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:₀₋₂ / Fol:₀ (IR) Ma / Mi / Mj

DOLLY F1

Φυτό: Πρώιμο και παραγωγικό, μέτριας ζωνρότητας με πολλαπλές ταξιανθίες.

Καρποί: 18-25 γρ., πολύ νόστιμοι και αρωματικοί με ελκυστικό κίτρινο χρώμα.

Ανθεκτικότητες: (HR) Fol:_{0,1} (IR) Ma / Mi / Mj

ΣΠΟΡΟΙ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΒΡΙΔΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ

ACROPOL F1
NEFELI F1
KARYATIS F1



ACROPOL F1

NEFELI F1

KARYATIS F1



Πιπεριά Κέρατο
τύπου Ουγγαρίας

Πιπεριά Φλωρίνης

Πιπεριά ντολμάς

ACROPOL F1

Φυτό: Υβρίδιο με κοντά μεσογονάτια και ισορροπημένη ανάπτυξη βραχιόνων. **Μειωμένες ανάγκες κλαδεμάτων και εργατικών.**

Καρποί: Κωνικοί, βάρους 120-160 γρ. Πολύ νόστιμη και αρωματική σάρκα με **μεγάλη διατηρησιμότητα.**

Η πλέον κατάλληλη και ανθεκτική για χειμερινή καλλιέργεια.

NEFELI F1

Υβρίδιο με υψηλή ανοχή στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού και στην τροφοπενία ασβεστίου (ξηρή κορυφή).

Φυτό: Ζωηρό, αραιόφυλλο με εύκολη καρπόδεση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

Καρποί: Εξαιρετικά ομοιόμορφοι και ίσιοι. Μήκος 18-22 cm και βάρος 120-150 gr. Έντονο και λαμπερό χρώμα.

Ανθεκτικότητες: (HR) TSWV

KARYATIS F1

Υβρίδιο με υψηλή ανοχή στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού. Κατάλληλο για **διαχείμαση** σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Φυτό: Ζωηρό, με συνεχή και ποιοτική καρπόδεση ακόμα και σε **κρύες συνθήκες.**

Καρποί: Τετράλοβοι, 8X10 cm ανοιχτού χρώματος, κατάλληλοι για την εσωτερική αγορά και για εξαγωγή.

Ανθεκτικότητες: (HR) TSWV

ΣΠΟΡΟΙ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΒΡΙΔΙΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ



Υπερπρώιμο καρπούζι

KALISTO F1

Φυτό: Ισορροπημένη ανάπτυξη με δυνατότητα αυξημένης πυκνότητας φύτευσης.

Εύκολη και πρώιμη καρπόδεση

Καρποί: Ελαφρώς οβάλ, 8-10 kg. Έντονο κόκκινο χρώμα και αρωματική σάρκα με πλήρη ανθεκτικότητα στο κούφωμα και μακρά διατηρησιμότητα.

ΣΠΟΡΟΙ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΒΡΙΔΙΟ ΓΛΥΚΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ



Γλυκό καλαμπόκι

THISEAS F1

Πρώιμο (70-75 ημερών) υβρίδιο με έντονο κίτρινο χρώμα καρπών.

Φυτό: Ψηλό (170 cm). Ύψος έκφυσης της ρόκας στα 70 cm. Καλά καλυμμένες και 100% εμπορεύσιμες ρόκες.

Καρποί: Γεμάτες ρόκες μήκους 25-30 cm με 14-16 ευδιάκριτες σειρές. Σπόροι στρογγυλοί και μεγάλοι, εξαιρετικά γευστικοί και αρωματικοί.

ΣΠΟΡΟΙ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΟΝΤΟ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ

Κοντό Αγγουράκι

14C2527 F1 NEO*

Ημιαυτοκλαδεύόμενο υβρίδιο. Κατάλληλο για ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή και φθινοπωρινή καλλιέργεια.

Φυτό: Ζωηρό με κοντά μεσογονάτια, 3-4 καρπούς/κόμβο και παραγωγικούς πλάγιους βλαστούς. Υψηλή ανοχή στο CYSDV (ίκτηρος της αγγουριάς).

Καρποί: Ομοιόμορφα κυλινδρικοί, με εξαιρετικό σκουροπράσινο χρώμα, μήκους 16-18 cm, ελαφρώς ραβδωτοί και πολλοί νόστιμοι.

Ανθεκτικότητες: (IR) CYSDV

ΣΠΟΡΟΙ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΒΡΙΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΓΟΡΑ

SCOOTER F1
BOGART F1



SCOOTER F1



BOGART F1



SCOOTER F1

- Υβρίδιο μεγαλόκαρπο (90 – 100 γρ.).
- Ζωηρό και εξαιρετικά ανθεκτικό φυτό με πολύ υψηλές παραγωγές.
- Καρποί σκληροί με έντονο κόκκινο χρώμα και αξεπέραστη γεύση.
- Ανθεκτικότητες: Pst, TSWV, Fol, V, N

BOGART F1

- Υβρίδιο μεσαίας ωρίμανσης με ζωηρό φυτό και καλή κάλυψη των καρπών.
- Καρποί 80 – 85 γρ. μακρόστενοι, Full Flesh (όλο σάρκα)
- Το πλέον ενδεδειγμένο υβρίδιο για λιαστή τομάτα.
- Ανθεκτικότητες: TSWV, Pst, Fol, V, N

ΣΠΟΡΟΙ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΒΡΙΔΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ

SARATOGA
KHROMA F1
AURORA F1
MORADA DE AMPOSTA



SARATOGA



KHROMA F1



AURORA F1



MORADA DE AMPOSTA



Φθινοπωρινό
κρεμμύδι

Ανοιξιότικα κρεμμύδια

SARATOGA

- Μεσοπρώιμη ποικιλία κιτρινόξανθου χρώματος.
- Ζωηρό και δυνατό φυτό με υψηλές παραγωγές.
- Βολβοί σφαιρικοί και εξαιρετικά ομοιόμορφοι.

KHROMA F1

- Υβρίδιο κίτρινου κρεμμυδιού με λευκή σάρκα, μεσοπρώιμης ωρίμανσης.
- Εξωτερικοί χιτώνες πολύ ανθεκτικοί με λαμπερό σκούρο πορτοκαλί χρώμα.
- Φυτό πολύ δυνατό και ανθεκτικό, με εκτεταμένο ριζικό σύστημα.
- Πολύ ομοιόμορφοι και ανθεκτικοί βολβοί με εξαιρετικά μακρά αποθηκευτική ικανότητα (≥ 7 μήνες).

AURORA F1

- Υβρίδιο κίτρινου κρεμμυδιού με λευκή σάρκα.
- Εξωτερικοί χιτώνες πολύ ανθεκτικοί με λαμπερό χρυσομπρούτζινο χρώμα.
- Φυτό δυνατό και ανθεκτικό, μεσαίας ωρίμανσης.
- Πολύ ομοιόμορφοι σφαιρικοί βολβοί.
- Μακρά αποθηκευτική ικανότητα (≥ 6 μήνες).

MORADA DE AMPOSTA

- Η πιο δημοφιλής ανοιξιότικη κόκκινη ποικιλία.
- Επιλογή της ISI SEMENTI.
- Σπόροι πολύ υψηλής καθαρότητας και άριστης φυτρωτικότητας.



ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ



**ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
FERTIBEST
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ:**

- Ομαλή και διαρκή θρέψη των καλλιεργειών με Άζωτο, που με την επιλογή των κατάλληλων τύπων η παροχή αζώτου μεγιστοποιείται (12 εβδομάδες).
- Μειωμένες απώλειες Αζώτου.
- Πολύ υδατοδιαλυτό Φώσφορο, άμεσα διαθέσιμο και αφομοιώσιμο.
- Το απαιτούμενο Κάλιο, για καρπούς με βάρος, μέγεθος, υψηλή ποιότητα και αντοχή
- Τα κατάλληλα ιχνοστοιχεία
- Λίπανση φιλική προς τους μικροοργανισμούς, βοηθώντας στην αποκατάσταση της χημικής σύστασης του εδάφους
- Μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση και αυξημένο κέρδος για τον παραγωγό

FERTIBEST 28.0.0
Η δύναμη
της FertiBest
τεχνολογίας
και σε υγρή μορφή

- Διαφανές υγρό διάλυμα που περιέχει 60% άζωτο σε μορφή αλυσίδων μεθυλενουρίας.
- Έντονη απορροφητικότητα του αζώτου και μετακίνηση μέσα στο φυτό.
- Εφαρμόζεται διαφυλλικά για την βελτίωση της ανάπτυξης, της ποιότητας και τη διόρθωση ελλείψεων αζώτου. Επίσης μπορεί να εφαρμοσθεί και στο έδαφος με το σύστημα άρδευσης (σταγόνα και καρούλι).
- Περιέχει 350 γρ. αζώτου ανά λίτρο.

**ΜΙΚΡΟΚΟΚΚΩΔΕΣ
ΛΙΠΑΣΜΑ
- ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ
STAR-TAN**
NP 8-35 (9SO₃),
με Σίδηρο (2 Fe)

Το STAR-TAN είναι εξειδικευμένος NP εκκινητής, ενισχυμένος με θείο και σίδηρο. Βελτιώνει την εγκατάσταση της νεαρής φυτείας, τον ρυθμό και την ομοιομορφία ανάπτυξης και αυξάνει την στρεμματική απόδοση.

Η χρήση του STAR-TAN εξασφαλίζει:

- Μεγαλύτερη πυκνότητα φυτών (λιγότερες απώλειες στο φύτευμα και την πρώτη ανάπτυξη)
- Ομοιόμορφη ανάπτυξη της καλλιέργειας. Ισχυρότερο ριζικό σύστημα και υγιή φυτά.

Το σύμπλοκο σιδήρου και φυσικής τανίνης που περιέχει, βοηθάει το ριζικό σύστημα να απορροφήσει φώσφορο και ιχνοστοιχεία από το έδαφος και προστατεύει τα φυτά από το στρες. Το STAR-TAN χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη βασική λίπανση.



ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ **FertiBest**

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	ΒΑΜΒΑΚΙ	ΗΛΙΑΝΘΟΣ	ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ
FertiBest 31-8-12 FertiBest 25-5-20 +B FertiBest 32-12-7+Zn FertiBest 30.8.12 +Zn FertiBest 29-5-17 FertiBest 30-5-5 FertiBest 29-5-16 +Zn FertiBest 33-10-7 FertiBest 30-8-12+Zn+B FertiBest 37-5-5 FertiBest 28-15-10 FertiBest 32-12-7 FertiBest 33-7-7+Zn FertiBest 9-30-22 FertiBest 10-24-18+2Mg+10 SO ₃	FertiBest 31-8-12 FertiBest 32-12-7+Zn FertiBest 30.8.12 +Zn FertiBest 29-5-17 FertiBest 18-16-16 FertiBest 24-7-7 FertiBest 33-10-7 FertiBest 21-38-0 FertiBest 28-15-10 FertiBest 32-12-7 FertiBest 30-7-8+Zn FertiBest 9-30-22 FertiBest 10-24-18+2Mg+10 SO ₃	FertiBest 25-5-20+B FertiBest 21-5-8 FertiBest 24-7-7 FertiBest 21-8-5 FertiBest 21-8-12+B FertiBest 20-7-10+B FertiBest 9-30-22	FertiBest 29-5-17 FertiBest 30-5-5 FertiBest 21-5-8 FertiBest 24-7-7 FertiBest 21-8-5

ΣΙΤΗΡΑ	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ	ΕΛΙΑ
FertiBest 25-10-0 FertiBest 20-25-0 FertiBest 19-28-0 FertiBest 23-18-0 FertiBest 30-15-0	FertiBest 15-8-15+5MgO+0,3B+Zn FertiBest 12-13-18+4MgO+0,3B+Zn FertiBest 18-10-22 FertiBest 20-11-16+2MgO FertiBest 6-16-32 FertiBest 14-10-19	FertiBest 25-5-20+B FertiBest 21-8-12+B FertiBest 20-7-10+B FertiBest 20-5-15+2MgO+0,3B FertiBest 18-6-12+2MgO+0,3B+Zn FertiBest 21-7-10+2MgO+0,3B+Zn

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΛΙΠΑΝΣΗΣ **FertiBest**

FertiBest 40-0-0
FertiBest 38-0-0
FertiBest 34-0-0
FertiBest 36-0-6
FertiBest 15 (45-0-0)
FertiBest 10 (45-0-0)
FertiBest 40-0-7
FertiBest 41-0-7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

	ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠ.	ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜ.	ΑΓΚΙΝΑΡΑ	ΑΜΠΕΛΙ ΕΠ.	ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝ.	ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ	ΑΝΤΙΔΙ	ΑΧΛΑΔΙΑ	ΒΑΜΒΑΚΙ	ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ	ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ	ΒΡΟΜΗ	ΒΥΣΣΙΝΙΑ	ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΙΤ
Alper Plus 4,5/68WG														
Arigo 51 WG														
Broadway 85WG														
Cabadex Extra														
Clincher Neo 200EC														
Corello 75WG														
Crossbow 600EC														
Curzate 60WG	✓ / 3	✓ / 3												
Delegate 250WG						✓ / 14		✓ / 7			✓ / 7		✓ / 7	
Equation Core WG		✓ / 3		✓ / 28	✓ / 28									
Eskif 120SC				✓ / 7	✓ / 7				✓ / 21					
Flash 120SC	✓ / 1	✓ / 1						✓ / 7						✓ / 7
Fontelis 20SC	✓ / 1	✓ / 1						✓ / 21			✓ / 3			
Garlon Duo 270EW														
Hector Max WG														
Jerdez 500WG									✓ / 14					
Karathane R 35EC	✓ / 3	✓ / 3		✓ / 21	✓ / 21									
Kerb Flow 400SC			✓ / 60	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / 28	✓ / -			✓ / -			
Lancelot 450WG														
Laser 480SC		✓ / 3		✓ / 14	✓ / 14		✓ / 3	✓ / 7 ή 14	✓ / 21	✓ / 7	✓ / 7		✓ / 7	
Lontrel 720SG														
Mustang 306SE														
Onore 240SC				✓ / 7	✓ / 14			✓ / 7			✓ / 7			
Pindar OD														
Primus Perfect												✓ / -		
Principal														
Rush 25WG														
Sirocco M44 WP	✓ / 3			✓ / 28	✓ / 28									
Staba 5EW				✓ / 28	✓ / 28	✓ / 120		✓ / 28			✓ / 3		✓ / 5	
Success 0,24CB														
Symbol SC														
Systhane Ultra 45EW		✓ / 3		✓ / 14	✓ / 14			✓ / 14			✓ / 7			
Talendo 20EC				✓ / 28	✓ / 28									
Viper OD														
Viper MAX OD														
Vydate 10GR														
Vydate 10SL	✓ / 50	✓ / 50												

επεξήγηση: ✓ (εγκεκριμένο στη καλλιέργεια) / 14 (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή)

	ΔΑΜΑΣΚΙΝΙΑ	ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ	ΕΛΙΑ	ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ	ΗΛΙΑΝΘΟΣ	ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΠΝΟΣ	ΚΑΡΔΑΜΟ	ΚΑΡΟΤΟ	ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΥΠ.	ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΘΕΡΜ.
Alper Plus 4,5/68WG												
Arigo 51 WG						✓ / -						
Broadway 85WG												
Cabadex Extra						✓ / -						
Clincher Neo 200EC												
Corello 75WG												
Crossbow 600EC						✓ / -						
Curzate 60WG											✓ / 3	✓ / 3
Delegate 250WG	✓ / 7		✓ / 21									
Equation Core WG												
Eskif 120SC												
Flash 120SC							✓ / 1				✓ / 1	✓ / 1
Fontelis 20SC									✓ / 14			
Garlon Duo 270EW												
Hector Max WG						✓ / -						
Jerdez 500WG												
Karathane R 35EC											✓ / 3	✓ / 3
Kerb Flow 400SC	✓ / -	✓ / -			✓ / -		✓ / -					
Lancelot 450WG												
Laser 480SC	✓ / 7											
Lontrel 720SG		✓ / 56		✓ / 42		✓ / 60 ή 90						
Mustang 306SE						✓ / 15						
Onore 240SC												
Pindar OD												
Primus Perfect												
Principal						✓ / -						
Rush 25WG						✓ / 80						
Sirocco M44 WP												
Staba 5EW			✓ / -									
Success 0,24CB			✓ / 14									
Symbol SC			✓ / 15									
Systhane Ultra 45EW	✓ / 7						✓ / -				✓ / 3	
Talendo 20EC												
Viper OD												
Viper MAX OD												
Vydate 10GR								✓ / -		✓ / 75		
Vydate 10SL											✓ / 50	✓ / 50

επεξήγηση: ✓ (εγκεκριμένο στη καλλιέργεια) / 14 (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή)

	ΚΑΣΤΑΝΙΑ	ΚΑΡΥΔΙΑ	ΚΕΡΑΣΙΑ	ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΥΠ.	ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΘΕΡΜ.	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	ΚΡΕΜΜΥΔΙ	ΚΡΕΜΜΥΔΙ (ΣΠ.)	ΚΡΙΘΑΡΙ	ΚΥΔΩΝΙΑ	ΛΑΧΑΝΟ	ΛΕΜΟ- ΝΙΑ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
Alper Plus 4,5/68WG													
Arigo 51 WG													
Broadway 85WG													
Cabadex Extra													
Clincher Neo 200EC													
Corello 75WG													
Crossbow 600EC									✓ / 60				
Curzate 60WG				✓ / 3	✓ / 3		✓ / 7						
Delegate 250WG	✓ / 14	✓ / 14	✓ / 3							✓ / 7			
Equation Core WG					✓ / 3								
Eskif 120SC													
Flash 120SC			✓ / 7	✓ / 1	✓ / 1					✓ / 7	✓ / 7	✓ / 7	✓ / 7
Fontelis 20SC				✓ / 1	✓ / 1								
Garlon Duo 270EW													
Hector Max WG													
Jerdez 500WG													
Karathane R 35EC				✓ / 3	✓ / 3								
Kerb Flow 400SC	✓ / -	✓ / -	✓ / -			✓ / 60				✓ / -	✓ / 60		
Lancelot 450WG													
Laser 480SC			✓ / 7										
Lontrel 720SG								✓ / -					
Mustang 306SE									✓ / -				
Onore 240SC													✓ / 14
Pindar OD													
Primus Perfect									✓ / -				
Principal													
Rush 25WG													
Sirocco M44 WP				✓ / 3									
Staba 5EW			✓ / 5							✓ / 28			
Success 0,24CB													
Symbol SC												✓ / 30	✓ / 30
Systhane Ultra 45EW		✓ / 60			✓ / 3								
Talendo 20EC													
Viper OD													
Viper MAX OD													
Vydate 10GR													
Vydate 10SL													

επεξήγηση: ✓ (εγκεκριμένο στη καλλιέργεια) / 14 (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή)

	ΜΑ-ΡΟΥΛΙ	ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΥΠ.	ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΘΕΡΜ.	ΜΗΛΙΑ	ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ	ΜΠΑΝΑΝΑ ΥΠ.	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ	ΠΑΝΤΖΑΡΙ	ΠΑΤΑΤΑ	ΠΕΠΟΝΙ ΥΠ.	ΠΕΠΟΝΙ ΘΕΡΜ.	ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΠ.
Alper Plus 4,5/68WG										✓ / 21			
Arigo 51 WG													
Broadway 85WG													
Cabadex Extra													
Clincher Neo 200EC													
Corello 75WG													
Crossbow 600EC													
Curzate 60WG	✓ / 7									✓ / 7	✓ / 3	✓ / 3	
Delegate 250WG				✓ / 7				✓ / 7					
Equation Core WG		✓ / 3	✓ / 3							✓ / 14	✓ / 3	✓ / 3	
Eskif 120SC													
Flash 120SC	✓ / 7	✓ / 1	✓ / 1	✓ / 7			✓ / 7				✓ / 1	✓ / 1	✓ / 1
Fontelis 20SC	✓ / 14	✓ / 1	✓ / 1	✓ / 21				✓ / 3					
Garlon Duo 270EW													
Hector Max WG													
Jerdez 500WG													
Karathane R 35EC				✓ / -							✓ / 3	✓ / 3	
Kerb Flow 400SC	✓ / 28			✓ / -			✓ / 60						
Lancelot 450WG													
Laser 480SC	✓ / 3		✓ / 3	✓ / 7					✓ / 3	✓ / 7			✓ / 3
Lontrel 720SG									✓ / 42				
Mustang 306SE													
Onore 240SC				✓ / 14				✓ / 7					✓ / 1
Pindar OD													
Primus Perfect													
Principal													
Rush 25WG										✓ / 30			
Sirocco M44 WP										✓ / 7			
Staba 5EW				✓ / 28	✓ / 28			✓ / 3					
Success 0,24CB													
Symbol SC													
Systhane Ultra 45EW		✓ / 3	✓ / 3	✓ / 14				✓ / 7			✓ / 3		
Talendo 20EC													
Viper OD													
Viper MAX OD													
Vydate 10GR		✓ / -	✓ / -							✓ / 84			
Vydate 10SL		✓ / 28	✓ / 28			✓ / 7					✓ / 50	✓ / 50	✓ / 35

επεξήγηση: ✓ (εγκεκριμένο στη καλλιέργεια) / 14 (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή)

	ΠΙΠΕΡΙΑ ΘΕΡΜ.	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	ΠΡΑΣΟ	ΡΑΔΙΚΙ	ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ	ΡΥΖΙ	ΣΑΛΑΤΑ ΘΕΡΜ.	ΣΕΣΚΟΥΛΟ	ΣΙΚΑΛΗ	ΣΙΤΑΡΙ	ΣΚΟΡΔΟ	ΣΟΡΓΟ	ΣΠΑΝΑΚΙ
Alper Plus 4,5/68WG													
Arigo 51 WG													
Broadway 85WG										✓ / -			
Cabadex Extra													
Clincher Neo 200EC						✓ / 60							
Corello 75WG										✓ / 60			
Crossbow 600EC										✓ / 60			
Curzate 60WG			✓ / 7								✓ / 7		
Delegate 250WG					✓ / 7								
Equation Core WG													
Eskif 120SC													
Flash 120SC	✓ / 1	✓ / 7			✓ / 7								✓ / 7
Fontelis 20SC	✓ / 1							✓ / 14					✓ / 14
Garlon Duo 270EW													
Hector Max WG													
Jerdez 500WG													
Karathane R 35EC													
Kerb Flow 400SC				✓ / -	✓ / -								
Lancelot 450WG										✓ / 60			
Laser 480SC	✓ / 3				✓ / 7		✓ / 3						✓ / 3
Lontrel 720SG												✓ / 42 ή 70	
Mustang 306SE										✓ / -			
Onore 240SC	✓ / 1	✓ / 14			✓ / 7								
Pindar OD						✓ / -							
Primus Perfect									✓ / -	✓ / -			
Principal													
Rush 25WG													
Sirocco M44 WP													
Staba 5EW					✓ / 3								
Success 0,24CB													
Symbol SC		✓ / 30											
Systhane Ultra 45EW	✓ / 3				✓ / 7								
Talendo 20EC													
Viper OD						✓ / -							
Viper MAX OD						✓ / -							
Vydate 10GR													
Vydate 10SL	✓ / 35												

επεξήγηση: ✓ (εγκεκριμένο στη καλλιέργεια) / 14 (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή)

	ΤΟΜΑΤΑ ΥΠ.	ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜ.	ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ	ΦΑΚΗ	ΦΑΣΟΛΙ	ΦΙΣΤΙΚΙΑ	ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ	ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ	ΦΡΑΟΥΛΑ
Alper Plus 4,5/68WG									
Arigo 51 WG									
Broadway 85WG									
Cabadex Extra									
Clincher Neo 200EC									
Corello 75WG									
Crossbow 600EC									
Curzate 60WG	✓ / 3	✓ / 3							
Delegate 250WG						✓ / 14			
Equation Core WG									
Eskif 120SC									
Flash 120SC	✓ / 1	✓ / 1							
Fontelis 20SC	✓ / 1	✓ / 1							✓ / 1
Garlon Duo 270EW									
Hector Max WG									
Jerdez 500WG									
Karathane R 35EC									✓ / 3
Kerb Flow 400SC				✓ / 90	✓ / 90				
Lancelot 450WG									
Laser 480SC	✓ / 3	✓ / 3				✓ / 7	✓ / -		✓ / 1
Lontrel 720SG									
Mustang 306SE									
Onore 240SC	✓ / 1	✓ / 1							
Pindar OD									
Primus Perfect			✓ / -						
Principal									
Rush 25WG	✓ / 30								
Sirocco M44 WP	✓ / 3								
Staba 5EW						✓ / 120			
Success 0,24CB									
Symbol SC									
Systhane Ultra 45EW	✓ / 3	✓ / 3						✓ / 60	✓ / 3
Talendo 20EC									
Viper OD									
Viper MAX OD									
Vydate 10GR	✓ / -	✓ / -							
Vydate 10SL	✓ / 28	✓ / 28							

επεξήγηση: ✓ (εγκεκριμένο στη καλλιέργεια) / 14 (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή)

[illegible]



DUPONT HELLAS S.A.

Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280
152 32 Χαλάνδρι

T: 210 6889700 | www.corteva.gr

PIONEER HI-BRED HELLAS S.A.

Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280
152 32 Χαλάνδρι

T: 210 6889717 | www.corteva.gr